

HENRICI NEPOMVCENI CRANTZ

PHILOSOPH. ET MED. DOCT.

CAESAREAE SCIENTIARVM ACADEMIAE  
MEMBRI

COMMENTARIVS

DE

R V P T O

IN PARTVS DOLORIBVS

A FOETV VTERO.



L I P S I A E,

IMPENSIS IOHANNIS PAVLI KRAVSII,  
BIBLIOPOLAE VIENNENSIS.

M D C C L V I.



ILLVSTRISSIMO  
AC CELEBERRIMO  
VIRO  
GERARDO

L. B.

VAN SWIETEN

AVGVSTISS. IMPERATORIS  
ET IMPERATRICIS

CONSILIARIO

ARCHIATRORVM COMITI

PVBLICAE IMPERIALIS BIBLIOTHECAE  
PRAEFECTO

INCLYTAE VIENNENSIS FACVLTATIS MEDICAE

PRAESIDI PERPETVO

ACADEMIARVM, REG. SCIENT. ET CHIRVRG.


PARIS. NATVR. CVRIOSOR. INSTITVTI BONONIENS.

ET LITERAR. INCOGNITOR. MEMBRO

PRAECEPTORI, PRAESIDI,  
MAECENATI

PVBLICAS AGERE GRATIAS VOLVIT

HENR. IOANN. NEPOM. CRANTZ.



# ILLVSTRISIME

ATQVE

## CELEBERRIME VIR



*iraberis abs dubio, TE in-  
scio, NOMEN TVVM huic  
Commentario inscribi. At  
ego nisi sic publicum grati animi docu-  
mentum TIBI ponam alias nunquam pos-  
sum; equidem, etsi hoc TIBI innatum  
est, humilitate propemodum nimia vo-  
luptate maxima omnes beneficiis deme-  
veri, ut an benigne feceris an receperis  
dubium relinquo, in iis, quibus me TI-  
BI deuinxisti officiis, id semper effecisti,  
ut mutus non eloquens, TVO favore per-  
cussus magis quam audax, Gratiarum  
Actionem coram TE recte exordiri nun-  
quam*

## D E D I C A T I O

*quam potuerim, et forte hodie ex longinquo loquens agro digne finire adhuc non possim.*

*Itaque patere ILLVSTRIS-  
ME VIR, qui nisi per furtum TIBI  
gratias agi non finis, ut publicas TIBI  
hodie pro omnibus agam referamque.  
Singula enim, quae in me contulisti bene-  
ficia, etsi maxima, quia priuata, recen-  
sere iniuria TVARVM virtutum fuerit;  
sed ea hic tantum modeste et carptim di-  
cam, quae toti urbi, toti Regioni, va-  
stissimo Imperio praeclare fecisti.*

*Summa cum voluptate recordamur  
omnes, AVGVSTISSIMAM  
DIVI CAROLI VI REGINAM  
FILIAM, IMPERATRICEM  
NOSTRAM, dum pacato, crudeli  
bello, orbe scientiarum sedes ubique  
Suis Imperiis restituere statuisset, TIBI  
VNI*

## D E D I C A T I O

VNI immenso labore, Regiis sumtibus, e patrio, euocato, solo, harum rerum summam consilio plane diuino decreuisse; recordamur incipientem TE, ne minimis rebus posuisse rudimentum, sed ita statim Regia dignitate et Maiestate, facem intulisse, ut an artes scientias in Cathedras reuocaris, an in his sedentibus et mutis animam tantum addideris, hodie, quia et id posteritatem ignorare voluisti, discernere non possumus; quodsi etiam ad intellectum celeritatem beneficii flectimus et in primum, quod oculis animo hausimus, magis inclinemus, in vnum tamen omnes assentimur, felicius longe euenisse ita destructas et dispersas fuisse, ut eleganti et firma hac creatione prodirent, quam nunquam eadem fuisse suscitatas et semper floruisse.

*Hoc Viennae primum, Pragae dein etiam factum. Sed maximum* ILLV-  
STRIS.

# DEDICATIO

STRISSIME VAN SWIETEN

*et TVVM illud est, quod a primis statim  
initiis in aegrorum solatium singulis  
diebus horam consecraueris, quod non  
rogatus, non iussus, Cathedram IPSE  
conscenderis, artem miseris mortalibus  
salutarem per octo annos indefesso animo  
professus fueris, ut immensa Imperio-  
rum spatia TVIS discipulis quondam  
impleres, ut imples; neque id vereri TV  
potes, quod AVGVSTISSIMIS  
IMPERATORIBVS ne unum qui-  
dem TVO afflatu ita fictum, qualem esse  
voluisses, ut foret vera TVI effigies, ex-  
hibere possis, utique nouerant AVGV-  
STISSIMI PRINCIPES TE  
talem qualem es natum esse, quod ante  
TVAM aetatem uni HIPPOCRATI  
et BOERHAAVIO contigerat, no-  
uerant inde TIBI facile fuisse priorem  
aequare, posteriorem vincere, quod no-  
bis impossibile.*

*Quan-*



## D E D I C A T I O

*Quantas denique non debet TIBI gratias optimus quisque, quod, publicos pro suprema artis salutaris laurea, minuendo sumtus, non tam auro, quam labori honorem haberi volueris. Quid dicam de illa infatigabili poene Collegiorum, sessionum, examinum Cura? quid de Praesidis Perpetui in Facultate munere, quod iniuisti, non ut ornamentum caperes, licet pro TE primo creatum fuerit, sed ut honorem dignitati, dignitatem membris dares et horum gloriam et felicitatem magis augeres.*

*Vltimo demum, TVA CVRA, liberalitate AVGVSTISSIMAE maiora dantis, quam saepe a Superis petuntur, ex fundamentis erutam Arcem, scientiarum et artium Nomine inscriptam stare, ibi iam Collegium Medicum TVIS praeparatis, MAGNI RVYSCHII Thesauris, quae omnia*  
*huic*

## D E D I C A T I O

*huic dono dedisti, Diues superbire, ma-  
ximas TIBI grates debet Ciuitas, Im-  
perium, IMMORTALES vero debe-  
mus omnes et ex corde agimus, quod per  
decem iam annos et AVGVSTISSI-  
MORVM PARENTVM et AV-  
GVSTISSIMAE SOBOLIS  
valetudinem adeo sollicite curaueris. Cu-  
res imposterum in seros annos, et IM-  
PERATOREM et IMPERATRI-  
CEM INVICTISSIMOS et AV-  
GVSTISSIMAM STIRPEM  
INCOLVMEM DEVS T.O.M.*

*seruet, optamus.*





# COMMENTARIVS

## DE

### RVPTO IN PARTVS DOLORIBVS

### A FOETV VTERO.

#### §. I.

**V**terum in partus doloribus rumpi rarum non est; at rupto vtero matrem emergere, et arte seruari superstitem, rarissimum. Sed estne in vteri ruptura ineluctabilis et absoluta lethalitas? an percussi et rupti vteri, quam cultro dissecti vulnus periculosius? qua demum de causa adeo misera illis mors?

#### §. II.

Vulnera vteri per se adeo lethalia non esse, felici omine in viuentibus toties instituta sectio Caesarea(a), totius vel maximae partis vteri extirpatio,

A 2

(a) Id euidenter euicere ROVSSETVS, RVLEAV, integris libris de partu Caesareo. BAVHINVS, MI-

ZALDVS, CORDATVS, SCHENCKIUS, infinitis obseruationibus. Hos hodie sequuntur Chirurgi principes omnes,

patio (b), huius visceris auulsio (c), dilaceratio (d),  
suppu-

omnes, posteaquam exsectio-  
nem vindicasset in Germania  
Celeb. HEISTERVS, in  
praeclaro illo opere Chirurgico,  
quod omnis Chirurgia  
miratur, et post illum D.  
SIMON dans les *Memoires  
de l'Academie de Chirurgie*,  
Tom. I. et II.

(b) Vterorum, sectione,  
vstione, ligatura, sine vitae de-  
trimento extirporum, me-  
morabilia exempla recensent  
ROUSSETVS *Traité de  
l'Enfantement Césarien*, Pa-  
ris 1581; PAVLVS lib. 3.  
cap. 72. NICOL. FLORENTI-  
NVS in 9 RHASIS. PA-  
RAEVS *lib. de hominis Gene-  
ratione* cap. 41. LANGIVS  
Tom. 2. epist. 39. BEREN-  
GARIUS; MERCVRIALIS;  
DVRETUS in HOLLERIVM;  
et plurimi alii apud SCHEN-  
CKIVM et BONETVM. Ra-  
ra itidem est, si vera FERNE-  
LLI observatio, qua asserit se  
vidisse parturientem, cui per  
genitalia decidens cum foetu  
incluso uterus, sine vitae de-  
trimento exsectus. Licet vero  
inter haec exempla ad observa-  
tiones et rationem ponderata,  
multa sint, quae potius poly-  
porum quam uterorum extir-  
pationes cum fundamento ha-  
beam, ut id facile demonstra-  
re possem: sic alia sunt, quae  
omne dubium diluunt; addam  
quod in *Actis Natur. Curios.*

Vol. I. obs. LXXX. pag. 152.  
Celeb. ZVINGERVS vteri  
prolapsi syderatam massam,  
tres cum dimidia libras ponde-  
rantem cum decidisset, ligatura  
extirpari curauit. Omnium  
vero euentissimum testimo-  
nium est Raymundi VIEVS-  
SENS, *Traité nouveau des  
liqueurs du corps humain*,  
Tom. 2. pag. 379, vbi in No-  
socomio Montis pessulano Io-  
annae BERGOGNEVSE a  
Chirurgo DVMAS, praesente  
D. GERMAIN Chirurgo,  
VIEVSSENS, BARBEYRAC  
et aliis medicis, ex genitalibus  
propendens amputatus uterus  
fuit, et lustratum post decem,  
quos illa adhuc vixit annos,  
cadauer ab iisdem, utrum tum  
reuera amputatum fuisse edo-  
cuit. Similis casus est PA-  
RAEI, *de hominis generatio-  
ne* lib. XLV.

(c) Sic et in procidentia  
auulsus fuisse a Chirurgo ute-  
rum, *observat. lib. 3.* pag. mihi  
747, testatur Felix PLATE-  
RVS.

(d) In naturali partu ex do-  
lorum vehementia, ut et capitis  
mole, vteri orificium saepius di-  
lacerari salua puerpera obser-  
vatum; sed et impune vteri  
orificium dilacerasse obstetri-  
ces multis observatoribus no-  
tum. Sic Clariss. LEVRE-  
TVS et ego anno 1752 Parisiis,  
obstetricem dedita opera, di-  
gito

suppuratio (e), gangraena (f); imo ipsa huius organi ruptura (g) cum matris vita perstans, luce meridiana clarius probant.

### §. III.

Quod etsi minime spernendum finistri, operationis Caesareae, euentus, observationum nume-

A 3

rum,

gito os et collum vteri, partus promouendi causa, dilacerasse nouimus, et alteram, dum languidius parientis os sacrum, arreptis postrosum humeris, calce pulsasset, non solum os vteri duobus locis disrupisse, sed et abdominis viscera in Herniam, sine morte nitentis, depulisse vidimus.

(e) Vterorum suppuratione foedatorum saluis mulieribus plurima exstant testimonia. Similia habent ALBVCASIS *lib. 2.* BENEDICTVS *de difficili partu lib. 25. cap. 33.* peculiari opusculo CORNAX. Imp. Med. ROVSSETVS *de partu Caesareo.* RIVALIER in *diario Med. mensis April. 1683.* item BLONDIN. Reginae Chirurg. in *novis inventis anno 1 mens. Martii 1679.* Atque in his aliisque omnibus observationibus etsi iure dubitari possit, vterum remera fuisse suppuratum; quum a foetu in tuba, ovario, ventre, concepto, aucto, dein mortuo, aequae ad umbilicum, ilia, hypochondria, inguina, aluum, oriri abscessus potuerit, nec semper necesse fuerit vterum

prius suppurari, vt ad haec loca foetus exire possit; ita sequentia rem certo certius confirmant et expositione simplici vterum suppuratum denunciant; qualia testimonia sunt MARCELLI DONATI, *hist. mirab. lib. 4. cap. 22.* FELICIS PLATERI *obs. lib. 1. pag. 215. in Sartoris uxore.* Observatio in *Hist. Acad. Reg. Scient.* anno 1709, pag. 23. observatio D. HOVIN. vteri post partum manu dilacerati et suppurantis LEVRETO missa.

(f) In observatione IV *Heur. à MOINICHEN*, dicit quibusdam per gangraenam computruit matrix nihilominus superfluitatibus vt confirmant, GATINAR, ROVSSETVS, SEVER, FERREVS, CARPVS, M. de GRADT, SCHENCKIUS: ideo vterus ad vitam non est necessarius, quemadmodum necnu tradunt WELSCHIVS, BARTHOLINVS, RIVERIVS, et alii.

(g) Vt id euidenter patet ex observationibus vtero perruptarum, quae in hac calamitate adhuc satis diu vixerunt, quod dein clarius exponam.

rum, in artis monumentis, existare non negem (b), et ipsa vteri vulnera percussione, et diuulsione (i) quam sectione facta periculosiora adhuc habeam, imo vteri rupturam veram vteri apoplexiam (k) iudicem, ne inde quidem vulnera vteri absolute lethalia esse et vteri rupturam immedicabilem, quin contra vt ante pluribus obseruationibus euitum hac culpa absolui, et tantum ex defectu auxilii desperata euasisse, prudentis animi sensu, inferri posse reor.

#### §. IV.

Neque id tamen ex simplici ratione statuo, inter tot enim de rupto vtero obseruationes et crudeles in partu casus, ne vnus quidem est, cui in tempore ex arte remedio subuentum, quodsi  
verum

(b) In operatione Caesarea infinitas numero mulieres periisse negari non potest, sed in his operantis ignorantiam, rusticitatem, audaciam, praeteruisum operationis momentum et alia ad exsectionem necessaria neglecta iure inculpat in *Aët. Chirurg. D. SIMON*.

(i) Idque ex multis rationibus, 1. quod in vteri percussione, diuulsione, causae impetus, violentia, in sectione vero moderatio intelligatur, 2. quod percussio, diuulsio, solutionem continui efficiens, sine contusione, inaequali fibrarum dilaceratione esse nequeat, sectio contra. 3. quod vtriusque dispar euentus, illius periculosior, difficilior, crudelior, huius longae tutior. Inde tamen conclu-

di non potest, percussione vteri esse absolute lethalem. vide Not. (g) si praeced.

(k) Apoplectico hic aliquid reperiri simillimum morbo patet consideranti, mulierem ad vterum percussam victimae ad instar concidere et corruere attonitam, viribus, voce priuari et iacere immotam, vnde haec vera apoplexia vteri est, sed vt non omnis apoplexia capitis desperata, ita nec vteri absolute lethalis, et quae in illa capitis rupturam vasorum efficiens causa, vt in illa vteri, indubitatae mortis discrimen intulisset, in hac vteri, inuitabile periculum non ponit, quia visceris ignobilitas hoc plurimum diluit.

verum vti verissimum, quomodo vis periculum in mortem non flectere? utique vulnera medicatu facilia, et quae nemo mortalium mortifera habuit, ex defectu auxilii, desperata conspeximus; vnde merito concludo vulnorum lethalitatem, non solum partis laesae, quoad vitam excellentiam, sed et artis aut impotentiam, impossibilitatem, defectum, aut praeposteram aut penitus neglectam applicationem inuoluere.

## §. V.

Atque sane ea est nostra in crudeli hoc casu infelicitas, quod non solum ars eis, quae tamen hanc exercent, desit, sed et ipsae sibi, et vel ad extrema aduocatus obstetricans, ex illis ne hilum quidem expiscari, vel ad tepidum iam cadauer, sectione facta, nihil nisi vterum ruptum videre possit; quod et ipsimet obstetricantes, quibus horrendas has mortes frequentius videre datum est (1), nec causas, nec signa, nec phaenomena, adeo terribilis mali nobis ex amissim transmiserint; vnde recta artis, ignoti et per suas causas et per sua signa casus, curatio, impossibilis hucusque esse debuit, et ni verae causae et certa mali signa obseruata fuerint, in omne aeuum erit.

A 4

§. VI.

(1) Sic in *Hist. Acad. Reg. Scient.* anni 1724, in *obs. anat.* No. IV certiores nos facit *Academia* vterum saepe in partu rumpi; GREGOIRE Chirurgum obstetricum 30 annorum spatio 16 tales casus vidisse. Sed quantum est in hac re inane utique iam plures an-

te illam id scriptis signarunt, nec tamen inde aut praecuidere stragem aut factam cognoscere didicimus; potuisset tamen magnum rebus his lumen adferre GREGORIUS, sed id ab *Academia* iactari, non perquiri sufficiebat.

## §. VI.

Scio equidem iam a multis medicinam, excisionem nempe, propositam (m). At quae ignoti morbi medela esse potest (n)? et quis dedita opera, leuem ob suspicionem, semianimem euiscerabit extispex? ut inter intestina fusum, quem nullo ibi signo ante adesse certo cognouit, infantem eximat. Quis se famamque suam, ut hodie flagitant, euentus obsides fore pollicebitur? Quodsi etiam aliquis, cuius rei nullum hucusque exemplum est, supra temeritatem audax promitteret, quis consanguineorum adhuc permittet? Si enim in casibus instituendae excisionis non dubiis, ubi scientia facti certitudinem, Religio iuuandi desiderium, spes successus gloriae stimulum adhuc dant, et cuncta simul persuasionis facultatem difficulter in nostras partes miserae consanguineos duci-

(m) Inter alios de operat. Caesar. in *Mem. de l'Acad. de Chirurg.* Tom. 2. casu 3. tractans D. SIMON his verbis: *Il n'est pas douteux, qu'on ne doive faire l'operation Césarienne; lorsque l'enfant a passé dans le ventre par la crevasse de la matrice. Il y a même peu de cas, où l'indication de la pratiquer soit aussi pressante; car l'enfant ne peut survivre long tems à cet accident; la mere est pareillement, en danger de perdre la vie par l'hémorragie considérable qui se fait ordinairement dans la cavité du bas ventre.*

(n) Idem praeuiderat iam ipse SIMON, dum pag. 325 ita habet: *La difficulté dans le cas dont il est question sera de reconnoître bien positivement que l'enfant est passé dans le ventre de la Mere.* Hanc vero difficultatem ex signis, quae adesse possunt, dilui credit, dum dicit: SAVIARD rapporte sur ce sujet une observation qui fait voir que ses signes peuvent se présenter d'une manière non equivoque. Sed creditur bonus SIMON omnem vteri rupti casum esse casum SAVIARDI, in quo prolapsus foras funis in abdomen non in vterum ducit?



ducimus, quid in re incerta summa periculi, anxius, dubius efficiet?

### §. VII.

Nolim tamen quis iam credat a me excisionem proscribi, quam secundum circumstantiarum rationem vel maxime necessariam, ipse dein statuat, sed tantum in ignoti mali auxilium animadvertere. Quanto satius fecissent Museorum illa oracula, si nos ante in cognitionem quam curationem duxissent. Forte iam apoplexiae vterinae accessum in prima sua calamitate cognouissent plurimi. Forte iam praesenti auxilio subuenissent, et ea dudum linea arti adiecta foret, quae adhuc adiicienda manet, quam ut recte assequar primo de causis dicam.

### §. VIII.

Quae rupturam vteri efficiunt causae, indagatu difficillimae, rationi quidem offeruntur plurimae, sed quis scit an verae et semper certo observatae? Tardior Magistrorum artis ad casus admissio, indolens observatio, et negligens horum communicatio, tenebras hic offundit maximas; non sunt tamen illae fingendae, sed vere observatae edocendae, de illis quibus mater occasionem praebet, incipiam.

Arctum nimis et naturae viribus vix superabile per angustiores pelvis aperturam, partus negotium (o), oris vteri angustia, difficilior et in-

A 5

suffici-

(o) Hanc causam facile ratio praefenserat; rationem vero confirmarunt plures observa-

tiones. Inter alias autem in *Ephemerid. Acad. Nat. Curios.* anno 5. 6. decurr. 3. obs. 133. Celeb

sufficiens dilatatio, ab excrescentia carnea, vlcere, scirrho oclusio (*p*), mala vteri conformatio, nimia in grauiditate extenuatio (*q*), inaequalis, a placenta in latere radicata, expansio (*r*), violentae vteri in partus labore supra foetum progredi non potentem contractiones (*s*) saepe rupturae causae existere.

*Ex*

Celeb. HARDERI, vbi apophysin acuminatam circa commissuram ossium pubis rupturae causam allegat; obseruatio Celeb. DOLDII, BONE TO relata, vbi ossis pectinis uimium depressi malam conformationem cum tenuiore solito vteri substantia de vteri ruptura et morte appellat.

(*p*) Hanc causam STALPARTVS VAN DER WIEL, cent. post. part. priore, pag. 319, ex ratione statuit. *Fabric. HILDANVS* cent. 1. obs. Chirurg. 64, ex obseruatione in casu Aurificis vxoris. Nec tamen huius experientia sola est, accedit adhuc obseruatio *Tobiae KNEBLOCKII* archiatři Onolsbacensis etiam BONE TO recensita, in *anat. pract. T. 2. pag. 110. in Miscell. Acad. Nat. Curios.* anno 2. decad. 1. obseruatio 254. TVDECIS de monte Galea, Item decad. 2. anni 7. obseruatio X. sub finem *Ludov. WIZEL*.

(*q*) LA MOTTE *traité complet des accouchemens à Leide cap. V. lib. 4. pag. 463.* ex ratione: STALPARTVS cent. post. parte priore, ex obseruatione XXX, vbi rupturae

vteri causam tenuitatem substantiae vteri inuenit in cadavere. Idem confirmat D. WIZEL obseruatione modo citata his verbis: *Rupturae causa fuit, quod medietas vteri in parte dextra scirrhusa reliqua foetui locum concedens nimis attenuata laboribus partus rupta fuerit.*

(*r*) Vterum inaequaliter ex radicata in latus placenta expandi distenditue, infinitis euicit obseruationibus LEVRETVS, vnde etiam vterum in tenuiori regione rumpi posse ratio dicitur, neque in hoc negotio adeo infelicem esse euidenter demonstrat obseruatio D. BVZAN, *Suite des obseruations*, LEVRETO recensita, pag. 74, vbi praeter praecleara vteri rupti phaenomena, etiam vterum in sinistro latere perruptum inuenit, radicata in latere dextro vteri placenta.

(*s*) Hoc in plurimis obseruationibus obtinuit. Sic in illa *Fabric. HILDANI* cent. 4. obs. 57. in matrona Bernensi. In illa MAVRICAEI obs. 251, vbi hanc maximam vteri rupti causam statuit. Vti et in illa iam citata KNEBLOCKII.

## Ex parte Foetus.

Crassum nimis infantis caput (t), caput inclavatum (u), infans robustior, fortior (x), inique situs (y), a quacunq̃ue demum causa conuulsus (z).

## A causis externis et aliis.

Sic a violenta abdominis percussione (a), casu (b), pressione (c), iniquis obstetricum Encheiresibus (d), medicamentis partum expellentibus (e) vterum ruptum legimus. §. IX.

(t) Idque ex omnium obstetricantium ratione, simul ex observatione D. BVZAN. observatione 49. vol. 2. *Act. Acad. Nat. Curios.* facta a Celeb. viro TREW. Idem et ex propria observatione assero.

(u) Hoc ex observatione MAURICAEI clarum est. Evidentius vero longe ex mea patebit.

(x) Ex ratione LAMOTVS, hanc vero omnes casus corroborant. Sic in observatione D. BVZAN. in observatione 151. vol. 5. *Act. Acad. Nat. Curios.* a Celeb. HAASIO conscripta. Observatione Celeb. viri TREW, MAURICAEI, propria.

(y) In illa Celeb. HEISTERI *Act. Acad. Nat. Curios.* vol. 1. pag. 399. iniquus foetus situs cum vehementissimis doloribus rupturae vteri causa fuisse videtur. Eadem in illa *Fabric. HILDANI*, de matrona Bernensi et aliis plurimis.

(z) Hoc LEVRETUM D. SOVMAIN, eius in arte praeceptor, ex frequenti obser-

vatione edocuit. Idem GUILLEMEAU de l'heureux accouchement pag. 636 et sequentibus etiam notauit, item DOLDIVS et alii.

(a) Hoc ex pluribus observationibus lib. 2. pag. 12 cuincit Henr. ROONHVYSIVS.

(b) Sequi supra tumidum abdomen ipsum, qualis est observatio in *Hist. Acad. Reg. Scient.* anno 1709 satis rara. Supra genua, qualem casum recenset FAVSSIVS in Epist. ad STRAVSSIVM citante BARTHOLINO de *insolitis partus viis* pag. 76.

(c) Vt ex mea observatione dein patebit.

(d) Iniquis vterum Encheiresibus ab obstetricibus dilacerari rara exempla non sunt, recensent MAURICAEVS; LAMOTVS; Notabilis vero historia est D. PEU, *Practique des accouchemens*, ubi casum D. GERVASIO dilaniatae narrat pag. 341.

(e) SALMVTHVS id ex observatione 6. cent. 1. fol. 12. confirmat.

## §. IX.

Quantumuis vero vnaquaque harum causarum apta nata sit, quae rupturam vteri efficiat, non ideo tamen velim putes, praesentem crudele hoc malum semper adferre; de contrario omnis fere partus praeternaturalis conditio conuincit, quae quoties cum causis rupturae, sine huius tamen effectu obtineat millenae observationes, docent; et haec securitatis et non praeuisi mali ratio semper fuit; nihilominus tamen ubi plures concurrunt, maxime vero inuoluntaria vteri aut violenta contractio cum robustioris foetus transprimi negantis renixu et conuulsione, certa vix non semper calamitas imminet, ut id omnes fere observationes liquido confirmant. At quo in loco vterus rumpitur? an omni visceris parte hunc foetus dilacerat? et quae denique vteri rumpendi, aut iam disrupti signa?

## §. X.

Perlegendo citatorum virorum observationes, constat euidenter fundum vteri (*f*), latus fundi sinistrum (*g*), latus fundi dextrum (*b*),  
latus

(*f*) LA MOTTEVS l. c. obs. 316. cum SOLINGIO, STALPARTVS cent. post. part. priore, obs. 30 videre, in cadauere in *Nosocomio Dei* dicto Parisiis, PINNEAU, GUERIN, LANAY Chirurgi, praesente et citante GUILLEMEAU pag. 239. GREGOIRE, referente PLANQVE Doct. Med. in *Bibliothèque choisie de*

*Medecine* Tom. I. pag. 121; quod tamen speculatione maior, quam observationibus prudentior impune negat ROEDERER in *element. art. obst.* cap. XXV. §. 784.

(*g*) Vt notauit D. BVZAN in obs. cit.

(*b*) In observatione MAURICAEI.

latus vteri finiftrum (*i*), latus vteri dextrum (*k*), ad ileon dextrum prope ceruicem (*l*), ad partem inferiorem paulo fupra internum os (*m*), ad partem inferiorem et anteriorem paulo fupra internum os (*n*), verfus ceruicem finiftri lateris (*o*), ad partem inferiorem et posteriorem in ipfo ore (*p*), infra os in parte poftica vaginae (*q*), in eius parte dextra (*r*), a foetu difrupta et dilacerata fuiffe. Insuper vterum diuerfis in locis fifsum,

(*i*) Latus finiftrum vteri omnino perruptum fiue perforatum vidit cum HEISTERO, DIEFENBACHIVS, ad latus finiftrum ibi loci, vbi vena et arteria Hypogaftica verfus medium vteri corpus afcendunt, vterum cum his vafis ruptum fifsum vidit in alia obferuatione GUILLEMEAU, praefentibus PINEAU Chirurgo Regio, FABER, BAILLOU Doctöribus medicis; in parte finiftra vna cum Secundinis difruptum TVDECIS, obf. citat.

(*k*) In obf. KNEBLOCKII, in matrona Bernefi HILDANVS.

(*l*) SALMVTHVS obf. citat.

(*m*) Quo fcilicet loco communis membrana a peritonaeo proueniens inteflinum rectum fimul cum vtero cingit veftitque STALPARTVS cent. 1. obf. LXVI. pag. 287. vt et Clariff. TREW in parte poftica inteftino recto proxima.

(*n*) Verfus pubem ruptum fe iuueniffe vterum teftatur

Celeb. REISELIVS *Mifcell. Nat. Curiof.* decad. 2. anno 7. obferuatione X. in articulo colli vteri ad pubem rupturam inueni ipfe.

(*o*) Verfus ceruicem finiftri lateris ita perforatum, vt ferme pugnus intronitti potuerit, vidit Andr. LÖW, in *Ephem. Acad. Nat. Curiof.* decad. anni 9. obferuatione 115. in vteri collo non procul ab orificio fub finiftro pubis offe Celeb. HARDERVS obferuat. iam citata.

(*p*) Vt ex cafu D. DEJEAN, Chirurgi Aurelianenfis, vna cum vtero LEVRETO miffo patet, vt et in alia mea quam mihi obftetrix communicauit, obferuatione.

(*q*) Vt in obferuatione XXV SAVIARDI *nouveau Recueil des obfervations à Paris* patet.

(*r*) Sic in *Historia Celeb. HAASII*, duos digitos transverfos infra orificium vteri et quidem in latere dextro rupturam factam afferit obferuator.

fissum (s), et a partibus quibus annectitur totum auulsum. (t) his in circumstantiis legimus.

### §. XI.

Ex quibus omnibus §. VIII et X praeter varias rupturae vteri causas, nullam fere vteri regionem, nullam vterini corporis partem hoc infortunio immunem fuisse conficio, et aeque ex radicata placenta fortiolem et praemunitum locum, quam debilem dilacerari et perfodi. Sed iam de rumpentibus vterum foetus membris agendum est.

### §. XII.

In duabus observationibus LA MOTTEVS, vt et in vna ALBINVS, vterum a foetu perforatum pedibus, viderunt. Retulit *Acad. Reg. Scient.* GREGOIRE se in vno casu pedes trans fundum vteri a latere placentaе actos vidisse. In parte sinistra vna cum secundinis pedibus vterum peruerat infans TVDECIS, BVZAN pede vno fundum vteri perforatum conspexit. In vna observatione STALPARTII genubus et pedibus vterum fodisse videtur foetus. Celeb. viri HEISTERVS, *Fabric.* HILDANVS, REISELIVS, DOLDIVS, DE JEAN, SAVIARDVS, vterum et vaginam capite dilacerata viderunt; ex quibus patet pedes,

(s) *Andreas LÖW* obs. citat. casu altero agit de muliere, quae per tres dies noctesque strenuè vsque ad mortem nixa est, inciso abdomine vterus pluribus in locis fissus inueniebatur.

(t) DOLDIVS obseruatione citata haec verba habet, *auulsus fuit vterus et dilaceratus a cernice seu sinu muliebri omnibusque vicinis partibus quibus adnasci solet.*

pedes, genua, caput, eas foetus partes plerumque esse, quae vterum transfodiunt. Sed an hae solae (u)? an non medius distractus abs harum partium transfossione, rumpi vterus potest? Has quaestiones, quas et physica cognoscit ratio, et confirmat experientia, iam non euoluam, accuratius de vteri disrumpendi, aut iam disrupti signis acturus.

§. XIII.

Quantum in utroque hoc capite desit, vnica haec, licet nec arti decora, nec honorifica consideratio conuincit, quod tum in citatis omnibus observationibus, in quibus adhuc pro artis emolumento aliquid erui, tum in alijs, quas euolui, et ex quibus ne minimum exprimi potest, non vnica sit, in qua obseruatorem non dicam rupturam praedixisse, sed tantum iam factam, sine cultro aut ignaro mali praetentatu cognouisse vtcunque intelligas. Quoniam vero crudelem hanc mortem subire parturientes non poterant sine adeo saeuis, qualis mors ipsa, pathematibus, ex recensitis omnibus observationibus cuncta colligere decreui, vt ex his Semeiotices eruenda doctrina securior et firmiter euaderet, et ex his, ex quibus salus, ex quibus desperatio oriatur, intelligeretur.

§. XIV.

Quibus igitur in partus negotio runpendus vterus est, iis vastum et distentum abdomen, retracta

(u) VESLINGIUS *Syn-  
tag. Anat. cap. 7* asserit se nunc  
caput, nunc pedes, nunc manus

per vterum ruptum in abdo-  
mine inuenisse.

tracta vagina (x), orificium altum, dolores quidem veri sed violenti, sine magnis interuallis frequentes, sine partus progressu ingrati (y), cum causis §. VIII recensitis statim ab initio, aut medio naturalis nixus tempore (z) adsunt. Atque hoc

(x) Haec signa vel maxime obtinent in illis, quibus robustus, voluminosus, infans, in superiorem pelvis aperturam intrare non potest, et ex validis ad partum conatibus vteri vaginam perfrangit infans et capite abdomen subit, hoc ex propria observatione habeo. Ventrem elatum, ita ut gemelli adesse crederentur, habuit mulier Celeb. Viri TREW, observatione citata.

(y) Hoc constanter omnes testantur; *per undecim horas doloribus violentis, longis, frequentibus, fuisse vexatam parturientem* LA MOTTEVS, obs. citata. De Jonae Pergo habet STALPARTVS, *vehementius longe quam quidem praecedenti tempore dum pareret, usque ad tertium diem infestatam cruciatibus fuisse.* Maximos pariendi conatus habuere mulieres, HEISTERI et MAURICAEI, et ambas, LÖW. in nullo partu crudelius nitebatur quam in ultimo grauida BVZAN. ambas mulieres apud HILDANVM adeo acerbis ac vehementibus corripiebantur partus doloribus, ut vix similes observati sint. Dolores violenti ex improviso

gravidam corripientes proximi partus spem fecerant, dicit SAVIARDVS, nihilominus tamen duorum dierum spatio continuauere sine progressu. In observatione Adami LOSPICHLERI in *Ephemerid. Acad. Nat. Curios.* Cent. 1, 2. Casu 149, ingrauescebant pariendi conatus tanta intra biduum per vices vehementia, ut de hora in horam desideratissimus rei euentus a cunctis audissime expectaretur. Item laborioso partu misere torquebatur mulier Pragensis; observante TVDECIS. Doloribus lancinantibus, non remittentibus, sed magis acutis, a primo partus exordio corripiebatur mulier apud HAASIVM.

(z) Atque in hoc recte ab illis doloribus ultimis expulsivis distinguuntur; notum enim est, in partu naturali dolores semper incrementum, ita ut dum nasciturus infans est, adsint etiam nolentibus inuoluntarii, et premere coactis vehementissimi, hi vero ipsi dolores, iis quibus vterus rumpendus est, medio nixus tempore contingunt nondum coacto in formam capite.



hoc adeo terribilis mali exordium est. Ruptis (a) aquis vero, dolores vehementius instant, sine intermissione improbi, sine partus spe crudeles ita mulierem discruciant, vt et ignarum vulgus his non enixam miseranter miretur. Atque tum alia  
omnium

(a) An in partus negotio stantibus adhuc aquis, vterus rumpatur quaestio est, medentium attentione dignissima. Quod probata facti veritas, iam ab exordio talis partus omnium animos terrore adimplere, falsitas hoc exonerare debeat; idque ex multis rationibus, si enim iam ante aquarum effusionem rumpitur vterus, vix exortus partus iam est immedicabilis, et primi dolores iam vltimi esse possunt, sin vero contra, non nisi aquis effluxis ruptura timenda est, est primo negotio securitas et deliberationi tempus. Vtrunque rationum momenta iam recte discutiam.

Omnes observationes authorum (Nro 1. c.) recensitorum, in quibus per vterum ruptum suppuratum ad vmbilicum, inguina, alium, nata exulceratio est, et foetus vel integer vel per partes eiectus, excipitur, totidem testimonia esse videntur vteri stantibus aquis perrupti, item clarior super hac re esse videtur observatio FAVSSII vt et illa ROONHVV. SII. Denique GUILLEMEAU vteri rupturam ex artificiali membranarum foetus di-

laceratione praeueniri posse statuit, quod et ipse assumit SIMON, euidenti argumento his praesentibus rupturam timuisse GUILLEMEAU, id etiam credidisse SIMON, quum ex priori citet, casum *vbi infans medio in abdomine aquis innatus*. Atque haec fortissima quidem sunt huius partis argumenta.

In contrarium stant ipsa GVLLMANNI in vol. 1. *Act. Acad. Nat. Curios.* obs. 3, vbi habet grauidam a tonitru percussam post octo tantum dies, foetum conuulsis rigidisque membris mortuum edidisse, puerperio sine rupti vteri signo incolumi. 2. Ipsae omnes observationes adeo mancae sunt, vt pro hoc puncto vix aliquid adferri possit, quando aquae ruptae sint, deest in casu FAVSSII, vt et in aliis fere omnibus, quarum testimonium in hac re vel inde nullum est, quod hoc in partus doloribus factum non sit, de qua re hic quaestio est. Quod praeceptum et casum GUILLEMEAU spectat, quum de conuulsione parturientium agat, statuo id auxilium esse in hoc casu indicatum, non vero in  
B violent.

omnium rerum ratio est, eaque vel maxime periculosa; iam enim se iactare foetus, vterum variis, nec limitatis interuallis premere, quater (b), sedem angoris (c) dolenter circumstantibus monstrare mater, donec tandem violentissimo subsultu elatus (d) foetus, contractum calcitratu vterum

violentissima vteri contractione, vbi ex vehementissimis doloribus et subsultu infantis vterus rumpendus est, alias enim ablata ab effluxis aquis resistentia, arctius se contraheret vterus, infans magis in angustum redigeretur, vnde facilius ruptura. Ex *Act. Acad. Reg. Chirurg.* eruta difficultas nulla est, quod textum GUILLEMEAU corruperit, sic enim pag. 321. vol. 2. habet SIMON, *L'enfant nageoit dans le ventre avec les eaux.* dum GUILLEMEAU l. c. pag. 239. scribit, *L'on trouva son enfant, (dans le ventre) nageant avec les boyaux:* quae sane non parua differentia est. Ex his patet, nihil certi in hanc rem statui posse; hucusque vero in bene descriptis observationibus vterus semper post effluxas aquas ruptus est.

(b) Hoc signum vix non semper cum praecedenti obtinet, licet ex citatis observationibus pauci id retulerint. Recensuere tamen LAMOTTVS, GUILLEMEAU pluribus locis, DOLDIVS, LEVRETVS, ex observationi-

(c) Illa angoris sedes vel ideo maxime notanda est, quod in illo loco vterus rumpendus veniat, non tamen illa confundenda est cum altera, quae iam rupto vtero nascitur. Diversa vtriusque signa hanc facile discernunt.

(d) Pauci id etiam notarunt. LAMOTTVS dicit adeo terribilem infantis subsultum suam mulierem sensisse, ut statim animo deficeret; exquisitae vero DOLDIVS his verbis: *instantibus vero partus doloribus iisque vehementissimis, (valide quippe puer monebatur) atque saepius toto triduo recurrentibus, quibus misere sed frustra excruciabatur, dolorum tandem saevitia potissimum tamen ultima illa nocte illis exasperatis viriumque resolutione prostrata interiiit; non minus egregie in HAA-SII observatione, in qua licet etiam obstetrix parturientem adstringeret, ut omnes quas posset intenderet vires, ad partum expellendum, et mulier etiam faceret, tantum tamen absuit, ut partus succederet, ut potius totus insequens octa-*  
vus

uterum perfodat, aut membro magis obtuso dilaceret (e).

## §. XV.

*Vteri iam disrupti signa.*

Vt primum vero ingentem hunc foetus in vtero succussum, quem etiam adstantes quandoque exaudiunt (f), mater sensit, plerumque ex vehementia doloris animo linquitur (g), dein vero interposito tempore ad se redit, et longe melius (h) se habere videtur; foetus motum, qui iam in eo, quem sibi parauit, tumulto immotus plerumque quiescit, raro vel nunquam amplius persen-

B 2

tit:

*vus dies Octobris inanibus consumeretur laboribus ad horam usque tertiam pomeridianam, quo tempore obstetrici ad aliam parturientem accersita priorem in lectum portatam dereliquit; ubi non nisi vnum alterumve experiebatur dolorem ad partum, quo finito statim de dolore maximo in dextro abdominis latere prope os innominatum valde conqueri inchoabat.*

(e) Vt in praecedenti Celeb. HAASII casu factum est, vbi capite infans vaginam perripit, recte ibi loci vbi illum dolorem maximum senserat, atque hac via in abdomen irruerat foetus.

(f) Sonum tanquam crepaturam audivit mulier apud FAVSSIVM, idem iam vt signum vteri rupti statuerat Celeb. HEISTERVS Chirurg. Tom. 2 de partu Caesa-

reo, pag. 726, iam id edocente BAVHINO. In obseruatione Andr. LÖW fragor auditus est ingens; post quem dolores cessarunt penitus; sine dubio tunc temporis diffraeti vteri signum.

(g) Notauit id in sua obseruatione LAMOTTVS, ex obseruationibus D. SOVMAIN, LEVRETVS; idem in alia factum est, quam noui, ob circumstantiarum vero defectum non describam.

(h) Quod inde euenire videtur, quod violentissimi miseram torquentes dolores ante rupturam, illico vbi ruptura facta est remittant, vnde etiam STALPARTVS in obseruatione *Fonae de Pergo ab illo tempore* (quo nempe vterus ruptus est) *multum leuaminis sibi obuenisse fassam.* Idem LEVRETVS et alii obseruarunt,

tit (i): absunt et partus omnes dolores (k). Quam vero inania ex remisso dolore ad salutem signa haec sint, ex sequentibus symptomatibus patet, breui enim, ex effuso, ex patulis vteri vasis, vitali humore aut foras effluere sanguis (l), aut vndequaque se attollere, et in latitudinem pristina destructa forma se laxare abdomen (m),  
 membra

(i) Posteaquam violentissimi dolores cessant apud parturientem D. BVZAN, iam per sex horas, intra quod tempus ille aduocatus fuerat, nec partus dolorem, nec infantis motum mulier senserat; ut primum ingentem illum subsultum foetus experta fuerat mulier apud LAMOTTVM, infantem amplius non percepit; hocque in aliis observationibus vix non perpetuum est, teste Celeb. LEVRETO.

(k) Hoc iterum vix non in omnibus observationibus verum est, dolores omnes et conatus parturientium cessasse nec deinceps rediisse in matrona Bernensi, HILDANVS. *Licet adhiberentur tam externe quam interne fomentationes, immunctiones, chyleres ex speciebus emollientibus carminatiuis cum oleo momordicae, cum internis pulueribus ad partum, August. borraee, aloe succorvina, croco, trochiscis de Myrrha, potiones confortantes, pellentes, etc. frustra tamen se operam sumfisse fatetur Andr. LöW. nullus rediit dolor;*

quod medicis simul indicare videtur, quam sint inania ex medicina, his circumstantiis praesidia. Confirmant id obs. SCHOLZII, LOSPICH-LERI: in quibus etiam nullus rediit dolor; in obseruatione HAASII tamen, ubi iam diu a rupto vtero in *fellam obstetriciam deportaretur, demum duo tresue, licet non tanto labori pares, inchoabant dolores.* an veri fuerint, dubitari merito subit; rem vero ipsam sic clare proponit, reliqua omnia rite erant comparata, nisi quod ipse vterus iam ita contractus fuerit, ut magnitudinem capitis infantis non excederet; vnde clare patet fuisse iam dolores secundos seu posthumos.

(l) Hoc in obseruatione Clariss. TREW. quandoque tamen ob praecium caput effluxus sanguinis impeditur, ut in obs. D. BVZAN, quandoque parum effunditur, ut in mea contigit, licet ad vteri orificium dilaceratio facta sit.

(m) Notauit id LAMOTTVS, qui mulieris ventrem durum tensum et dolentem invenit,

membra foetus tactu distinctius longe percipi (n): mulieri non amplius constare vultus, sed decolorari facies, excauari oculi, obnubilari, fufurrare aures, decidere, pulsus intermittere, iam mortis frigus artus, corpus viscidus sudor occupare, tum vox deficere, frangi, animus linguere, mulier convelli (o), donec tandem mente et sensu capta crudeliter rapiatur.

## B 3

## §. XVI.

venit, abdomen valde tumidum, et hinc inde cum primis in regione epigastrica atque lumbari sinistra inaequale deprehendit Clariss. TREW. maxime inflatum sed molle et sub pressione fugiens D. BVZAN; tumidum tensum inaequale ego ipse inueni; quadratum, sed molle vult esse LEVRETVS.

(n) Id iam inter signa vteri rupti posuerat Celeb. HEISTERVS, nec tamen perpetuum est.

(o) Non omnes semper eandem mortem obiere: animam placide reddidit mulier SCHOLZII; HAASII mulier praecedentibus lipothymiis placide mortua est, illa LOSPICH-LERI exhausta integris sensibus extincta est, prima mulier Andr. LÖW horroribus circa vterum corripiebatur, multum sitiebat, accedentibus lipothymiis et convulsionibus decessit, mulieres DOLDII, LAMOTTI, virium resolutione prostratae interiire; Ionae de Pergo apud STALPARTVM,

non solum deliquiis, opprefione, horrore, feбри, sed et plurimarum obscure viridium faecum vomitu, reiectione, angoribus, victa decessit mulier BVZAN, viribus fracta oculis semiclausis, voce quassa vix exaudienda, pulsu debili, parvo, ventre inflato sed molli extincta est. His in casibus animi deliquia, convulsiones, cum et sine mentis alienatione notantur WELSCHIVS, DIONISIVS, PISTORIVS, ex obs. SOVMAIN, Celeb. LEVRETVS; sic in mea observatione, dum frequentes habuisset animae defectiones mulier, convulsa rapta est. Optime vero iam ante omnes CELSVS lib. 5, cap. 26, nro. 13 de signis percussae vulvae: *At cum vulva percussa est, dolor in inguinibus et coxis et feminibus est: sanguinis pars per vulnus, pars per naturam descendit: vomitus bilis insequitur. Quaedam obmutescunt; quaedam mente labuntur; quaedam, sui compotes, nervorum oculorumque dolore urgeri*

## §. XVI.

Scire tamen adhuc oportet, nec eam pathematum seriem constantem esse nec perpetuam, siquidem aliquibus has, aliis illas vel maxime torqueri, obuenit; imo quasdam, quod funeste subdolae mortis est, sine omnibus vteri perrupti signis conquiescere et mori (p): alias iterum per diuersos a prioribus cruciatus, noua tormenta, ad vltimum vitae terminum perducunt. Atque in his fere tanta suppliciorum varietas est, quantus dispar in omnibus mobilitatis et irritabilitatis gradus, quanta est functionum, viscerum in abdomine contentorum, et ex vtero in hoc erumpente foetu laesorum, diuersitas, verbo qualis est ipsa laesio et viscus laesum, tale est mulieris tormentum.

## §. XVII.

*vi se consitentur; morientesque eadem, quae corde vulnerato patiuntur; . . . sanguis multus fertur; venae languescunt, color pallidissimus, sudores frigidi malique odoris, tanquam in aegrotato corpore oriuntur; extremisque partibus frigidis matura mors sequitur.*

(p) Qualis mirabilis exstat apud GUILLEMEAU, l. c. pag. 235 casus, quem ex gallico idiomate in latinum sic transfero.

Domina De MOMMOR 25 annorum primis ad quartam aut quintam matutinam, partus admonetur doloribus, surgit tamen et vicinum tem-

plum petit; redibant per intervalla partus dolores; profluebat continuo sanguis. Ad finem tertiae diei placide parturit abs obstetricis auxilio, nam et placenta foetum statim secuta est; nihilominus tamen adhuc eadem die ad noctem expirauit; intentiore quidem, primo, a parentibus qui mortuam esse credere non poterant, animo seruabatur; apertum vero dein cadauer vterum ruptum exhibuit.

Ex qua quidem obseruatione praeter argumenti probationem patet, non semper ex vtero rupto in abdomen foetum, sed et in mundum nasci.

## §. XVII.

Itaque ut primum vterus perruptus est, extensus per vterum in abdomen, vel vtero relicto, in hoc totus effusus foetus premendo diaphragma, singultum, respirationem difficilem, oppressionem, anxietatem, animi deliquia, convulsiones; ventriculū, ingentem grauitatem, dolorem, vomendi conatum, vomitum (q); Hepar, anxietatem, bilis porraceae reiectionem; intestina, dolores colicos (r), iliacos; Lienem, obtusum dolorem, oppressionem et prioribus similia aut diuersa symptomata excitat. Quodnam vero horum viscerum id sit, quod patitur, docet cognita partium in cauo sedes, laesa harum functio et acerrimus, quem priorum omnium oblita puerpera circumstantibus verbis, manu, oculis designat, residens noua in parte dolor nec dimittens angor (s). Atque hic fere omnium calamitatum finis est.

## B 4

## §. XVIII.

(q) Vomitum rupto vtero saepius adesse testantur observationes: mulier REISELII obiit praecedente saepius vomitu; continuo bilem porraceam vomebat mulier in mea observatione; idem mulieri LAMOTTI contigit; in observatione Celeb. HAASII post vterum ruptum ingruebant vomitus, qui in biliosos nigerrimos postridie mutati sunt; sic etiam in illa mearum observationum, quam ad finem communico, misere singultiebat mulier.

(r) Sic in SAVIARDI observatione in ventriculo grauitatem, horrendos in abdomine cruciatus sentiebat mulier, ita ut in ventrem humi procumberet, aperto cadauere erant corrota intestina, ventriculus, infantis pedibus, pressus.

(s) Frequentibus id observationibus LEVRETUS testatur, senel et ego eundem in regione Hepatis obseruavi, neque tamen id mirum est, quum iam in abdomen natus foetus, aliud viscus mulset; ut euidentissime superius ex cadauere a SAVIARDO inciso patuit.

## §. XVIII.

Notatu vero in his omnibus vel maxime necessarium est, quandoque intra solum metum periculum consistere, et hoc obstetricantem defunctum, illo absolui, ut in tribus iam recensendis casibus fieri observatum est.

*Primo*, in partu naturali inter nitendum, quandoque ita in longitudinem a foetu extenditur vterus, ut et ventriculum ex compressione evertat, sine eo tamen quod vterum perumpat (t).

*Secundo*, in omni partu moriens in sinu matris foetus, vterum plerumque percutit (u), atque id ex consuisione est.

*Tertio* denique funis umbilicalis rupti casus vterum perforatum ex asse. mentitur; his enim rebus et subsilit infans et vterum percutit, epigastrium undique eleuatur, intumescit, viribus fracta mulier iacet ut percussa, quod Clariss. LEVRETTO videre contigit (x). Ex his vero patet, id quod in arte salu-

(t) Vomere parturientes non adeo infrequens est, et vix notatu dignum; sed ab extenso a foetu vtero ventriculum everti rarius et scrupulosius observandum, ne statim vteri ruptura, quae aliquando timenda non est, timeatur et in praeceptis nimis praesidium Chirurgus delabatur. Sic rara apud parturientem observatione mihi videre contigit, foetu ad partum bene disposito oboriri dolores spurios, ab his vterum in longitudinem extendi, ita ut illius fundum fere ad cartilaginem

Ziphoideam perciperem, mulierem inde saepius vomere, abs illato damno; mutatis enim rebus feliciter peperit. Id vero in emortuis foetibus saepe obvenit.

(u) Hoc observatoribus satis superque notum est. Ego quidem ex hoc solo signo in haemorrhagiis, iam saepius momentum, quo expiraret foetus, edixi.

(x) *Suite des observations* pag. 187, observatione trigesima tertia, quae ob casus raritatem quoad in rem nostram facit, hic transcribi meretur:



salutari, verum et certum habetur esse in confinio falsi et dubii, in eo vt exacte interdistinguantur neruum esse, ne curationes inter se confundantur; in prioribus tamen casibus fere securitatem dant dolores spurii vterum eleuantes inflantes quasi, quod maxime in primo verum est, quies

B 5

et

Je fus appelé à dix heures du matin le 24 Août pour accoucher une Dame à terme de son troisième enfant. Cette Dame est âgée de 35 ans, elle est d'une petite stature, mais bien faite & d'un bon tempérament; elle n'avoit pas éprouvée la moindre incommodité pendant tout le tems de sa grossesse, si non que dans les derniers mois, elle eut les extrémités inférieures enflées & surtout la droite, & qu'elle étoit sujette par intervalles, à quelques crampes dans ces parties, quoiqu'elle eut été saignée quatre fois en différens tems. . . . Il y avoit alors huit jours consecutifs qu'elle perdoit de moment à autre ses eaux: elle m'apprit qu'elle avoit été 36 heures en travail de son premier enfant, quoiqu'il se présentât bien, mais parce qu'il étoit d'un volume considerable; qu'on avoit été obligé de retourner le second qui étoit aussi très-gros: & qu'elle avoit restée toutes les deux fois très-long-tems après être accouchée sans uriner.

Je touchai cette Dame qui avoit des douleurs depuis le

point du jour; je sentis au fond du vagin, une petite portion d'un fort gros globe, mais je ne pus atteindre l'orifice parce qu'il étoit encore trop haut & situé très-postérieurement, à raison de ce que le fond de la matrice se portoit considérablement en devant. . . . Lorsque j'y retournai à trois heures après midi, les douleurs n'avoient pas discontinué. Je la touchai de nouveau, & je trouvai que la portion du globe que j'avois sentie la première fois au fond du vagin étoit descendue plus bas, & qu'elle étoit devenue plus grosse: mais je ne pus encore parvenir à toucher l'orifice de la matrice. Ce ne fut qu'à six heures que je commençai à en sentir le bord antérieur, en forme de croissant, qui me présentoit sa convexité: il étoit mollet & de l'épaisseur d'un ecu de six livres au plus, il s'eninça & se dilata considérablement dans l'intervalle du tems qui se passa jusqu'à 9 heures du soir. Il sortoit à la fin de chaque douleur un peu d'eau, mais il ne parut point de sang. . . . Sur les dix heu-

et relaxatio vteri, quod secundus sibi vendicat, maximorum dolorum absentia, absentia signorum §. VIII designatorum, quod omnibus tribus commune est; dolores autem veri continui violenti et signorum §. VIII praesentia periculum commonstrant.

## §. XIX.

res l'orifice de la matrice s'effaça tout-à-fait, & la tête remplissoit alors presque tout le vagin : la tumeur qui s'étoit formée peu à peu sur cette tête égaloit à peu près le volume d'une balle de jeu de Paulme dont on auroit retranché un quart . . . Depuis dix heures jusques à deux heures après minuit, la tête n'avança plus, quoique les douleurs se soutinssent allées fortes & très-près les unes des autres mais entrecoupées. . . Il ne sortit plus rien de la matrice . . . Les grandes levres étoient comme des vessies pleines d'eau.

Sur les deux heures après minuit la Malade se plaignit de sentir quelques tressaillemens douloureux dans la matrice, ce qui me détermina à ondoyer l'enfant. J'appliquai ensuite légèrement mes mains sur le ventre de la mere qui étoit très-tendu, dur, & extrêmement douloureux, & je distinguai, à plusieurs reprises de petits coups secs & subits en diverses parties de la matrice tout à la fois : ce qui me fit juger que l'enfant se mourroit & que ces tressaillemens étoient

des especes de mouvemens convulsifs de toutes ses parties ensemble. En effet, dès ce moment la tumeur de la tête commença à se flétrir ce qui me fit proposer à la Malade déterminer son accouchement par art. Elle balança d'abord mais un evenement la détermina après . . . Cet evenement fut qu'à la fin de chaque douleur, le ventre prenoit de plus en plus du volume surtout dans la region épigastrique. J'y portai les mains & je la trouvai très-dure, ce qui me fit soupçonner qu'il se faisoit une hémorragie interieure par le décollement de quelques points du placenta, & non par la rupture de la matrice, car alors le ventre devient mollet . . . La Malade & son poulx s'affoiblissant je décidai qu'il falloit sans aucun délai l'accoucher pour lui sauver la vie . . . Je parvins non sans peine à déclaver la tête. . . L'enfant avoit autour du col plusieurs tours de son cordon qui l'avoit étranglé : . . . désque l'enfant fut passé il sortit tout à coup un flot de sang & plusieurs caillots ce qui justifia le jugement que

## §. XIX.

Intellectis iam rupturae vteri causis, rumpendi aut iam disrupti vteri signis proximum est, ut de futuri mali prophylaxi, praesentis curatione agamus. De prophylaxi equidem vix aliquid hucusque nisi apud LEVRETUM (y) statutum est; de curatione vero diuersae, quid in adeo graui re sentiam, iam dicam, atque primum de prophylaxi.

## §. XX.

Si itaque tali partus negotio implicaretur obstetricans, cuius funestum ex signis §. VIII recensitis, euentum liquido nimis perspiceret, in id vnum neruum intendere debet, praesentis futuriue mali causas ut expiscetur. Rationalia quidem ut notum causarum signa, grauiditatis transactae, regimen, sanitas, aegritudo, praecedentes partus, ipsa mulieris constitutio; tactu percipienda vero, abdominis externa inspectio, orificii vteri, ut et foetus exploratio, euoluunt, quascunque vero in-

venerit,

que j'avois porté; je comptois conséquemment que le placenta s'étoit décollé, mais ma surprise fut des plus grandes quand je reconnus que c'étoit le cordon ombilical qui s'étoit déchiré. . . .

(y) *L'art des Accouchemens démontré par des Principes de Physique & de Mécanique.* Paris 1753. §. 607. „Quant à la cure prophylactique de ce terrible accident, il faut de la première secousse doulon-

„rense que la femme en travail  
„se plaindra de ressentir vers  
„la region epigastrique; lui  
„tirer du sang du bras jusqu'à  
„ce qu'elle tombe en syncope si  
„la chose est possible. §. 608.  
„Si d'ailleurs on peut trouver  
„le moment favorable d'intro-  
„duire la main dans la matri-  
„ce & que la tête puisse être ré-  
„poussée sans danger, on doit  
„se hater de retourner l'enfant  
„pour essayer par ces précautions  
„methodiques de le sauver avec  
„la mere.”

venerit, ad rationem et experientiam statim ponderet necesse est, vt an tuto auxilio solui velint an negent ante calamitatem intelligat, ne sēro nimis medicina paretur. Quodsi enim aut per malam ossium pelueos aut huic adiacentium (2) conformationem, aut per crassius, etiam satis recte constructa pelui, quod in plurimis obseruationibus accidit, infantis robustioris caput, vterus rumpendus praeuidetur, spe extrema omnia pendent. Si vero mala vteri conformatio, vterus in herniam compulsus, nimia vteri, in grauiditate extenuatio, inaequalis a placenta lateri radicata expansio, oris vteri angustia, difficilior et insuficiens dilatatio, ab excrescentia carnea, vlcere, scirrho nata occlusio, conuulsionibus actus infans, infans inique situs, rumpendi vteri causae intelligantur, salutaris artis praesidia, non ita exhausta esse, vt vnus auxilium causae, alterius ratio sit, quin contra ex plurimis fontibus, facilem emanare posse salutem, tenendum est. Quod in vltiori harum causarum disquisitione, quam iam suscipio, luculentius demonstrabo.

### §. XXI.

Iniqua ossium pelueos conformatio, natae in cauo peluis exostoses (quorum alterutrum Rachiticis semper proprium est) difficile aut impossibile plane

(2) Hodie enim certis obseruatis constat, etiam bene conformata pelui, vltimas lumborum vertebrae partum impossibilem efficere. Item fe-

moris caput ex acetabulo in foramen ouale motum, partum ante reductionem reddidisse impossibilem communicauit Celeb. LEVRETVS.

plane partus negotium semper efficere. Vnde etiam obstetricantes, ex maiori minoriue tum deformitatis, tum angustiae pelueos gradu, diuersa in his casibus tentarunt, imo extrema statim ab initio prudenter experti sunt; verum enim vero si deformis et angustior peluis iam per se operationis Caesareae instituendae potissima ratio sit, in nostro casu talis peluis non solum obtineat, sed et vt vteri rumpendi causa timenda sit, patet excisionem vnicam et solam esse anchoram salutis. Et sane si excisio aut differtur aut negligitur, in calamitatem omnia recidunt, nihil enim amplius in arte opis est.

## §. XXII.

Altera rumpendi vteri causa est crassius robustioris infantis caput; haec causa aequae ac prior impertinens, id adhuc amplius habet, quod bene etiam conformata pelui, vt saepissime accidit, subdola fallax obstetricantem in naturalis partus spem et expectationem illiciat, quo interea temporis mortem matri tutius inferat et spem in desperationem conuertat; neque tamen id mirum est, obstetricantis animum adeo facile in cunctationem flecti, quum et ipsa saeculorum experientia tot robustos vasti capitis infantes a natura cum tempore transpressos, tot alios in peluim impactos, forcipe aut aliis instrumentis extractos confirmet, neque in initio partus ex capitis mole statim desperationem adesse. Atque ex his rationibus semper hunc casum priori, licet aliis facilius videatur, deteriorem habeo eoque vel magis luctuosum;

quod

quod dum adhuc certa spes superesse creditur, iam omnis in angusto constituta sit salus.

§. XXIII.

Verum enim vero si tanta in signis huius casus allucinatio, si eiusdem causae multiplex euentus esse potest, merito dubitari subit, an ab hac causa rumpendi vteri prophylaxis possibilis? Quum vero vel maxime necessarium sit obstetricantem in hoc negotio non eludi, irreuocabile hoc praeceptum, quod dubium simul diluit, ponam. In casibus, in quibus etiam bene conformata pelui capitis infantis vastitas difficultatem partui adfert, cum eidentibus rumpendi vteri signis, partus a natura sperari citra culpam non potest, nec citra ignorantiam debet. Etenim cunctatio semper cruenta fuit, ut ex omnibus observationibus patet, et nata ex bene conformata pelui spes inanis et vacua; sed quo auxilio rupturam vteri praeueniri velim rogas? Dicam, operatione Caesarea. Hoc vero praesidium iterum primus contra omnium opinionem ex his rationibus propono.

*Primo*, quod in negotio, ubi ex crassi nimis, robustioris infantis capite, ruptura vteri timenda est, nullum in vtraque medicina, praeter sectionem Caesaream, praesens auxilium sit.

*Secundo*, quod versio infantis, quam quidem, vix non omnes in casu capitis crassi nimis, satis inepte proponunt, foetui semper lethalis, matri vero maxime periculosa sit: ut id in alio argumento, quod *Acad. Natur. Curios.* misi, plusquam satis probaui.

*Tertio*,

*Tertio*, quod capitis diffractione per perforatoria, foetus extractione per vncos non solum deliberate occidatur, sed et ipse vterus ab auxilio in mali prophylaxin ut credunt adhibito, citius perumpatur. Qui enim aliter fieri potest, ut iam validioris roboris foetus, qui, quia ob corporis molem transprimi non potest, agitur, subsilit, convellitur, ab instrumento transfixus in parte totius corporis sensilissima, non validius subsiliat, convellatur, atque his motibus acceleratis et auctis vterum certo certius perumpat. Atque haec duo tamen auxilia sola sunt, quae adhiberi possent; alia nulla ars novit. Quoniam igitur unum altero iniquius est, iterum solam operationem Caesaream, mature adhibitam mali medelam statuo (a). Unicum vero id auxilium mali, malo gravius esse ab aliquibus obiici posse video, nae illi tamen rem recte perspexere, licet enim sectio vteri gravis opera-

(a) Contrariae prorsus opinionis video esse D. SIMON in *Mem. de l'Acad. de Chirurg.* Tom. 2, pag. 333, his verbis: *Désque la femme à les os du bassin bien conformés & que les parties molles ne présentent aucun obstacle par une disposition contre-nature, quelque soit le volume de l'enfant, il ne paroît pas qu'on puisse être dans le cas de pratiquer l'opération Césarienne.* Precario vero haec et sine rationis aut experientiae fundamento statui, euidenter ipse perspiciet, nec dubito cum illo Parisienses, perspecto hoc casu,

in meam ituros sententiam, ni forte cum SIMONIO caput hoc ut Hydrokephalon vncotentari velint; de quo paulo supra scribens haec habet: *Il n'est pas possible qu'il soit vivant, & que sa tête soit augmentée par l'épanchement Lymphatique sans mettre obstacle à l'accouchement. Mais on doit procéder dans ce cas à l'extraction du fœtus avec le secours du crochet.* In ea vero re *Academiam Chirurg. Paris.* admirari liceat, quod propositione, quam experientia refellit, Religio reprobatur, obstetricantes corrumpat; hydrokephalos vitales

operatio fit, est periculosior sectione vteri per-  
ruptio, et adhuc dilacerato vtero, ad sectionem  
absolute deueniendum est, vt dein fufius dicam.

#### §. XXIV.

Atque haec quidem immodicae capitis vasti-  
tatis sola vera prophylaxis praeposterà est in illa  
rerum constitutione, vbi maior quidem naturali  
capitis moles, peluim subit, vbi dein angustiae  
implicita et retenta, vteri rupturam interminatur,  
quia solus forceps hic tempestatem declinare va-  
let, vt immortalis exemplo in obseruatione trige-  
sima tertia (b), et in alia, quam mihi Parisiis com-  
municauit LEVRETUS, reliquit; aderat nempe  
parturienti D. M... quae ob angustiores pel-  
ueos conformationem in partu crudelius semper  
nitebatur; effluxerant iam ab aliquot horis aquae,  
dolores solidi infantis caput iam in formam fude-  
rant, vnde emersionem sperare posset. Expecta-  
bat, dum subito, subsiliente infante se percuti  
exclamaret mater, tum ille periculi gnarus, muta-  
to statim consilio immissa forcipe caputprehendit  
et foetum salua matre extraxit.

#### §. XXV.

tales nasci, plurimis obseruationibus testatur in vol. I. obs. I. *Aët. Helvet. Rudolph. ZVINGERV. S.* Hydrokephalon viu-  
um natum annum viuente, citat in appendice Vol. IX. *Aët. Nat. Curios. Celeb. BOEHMERVS.* Hydrokephalon viu-  
um natum tres menses viuente ipse LEVRETUS *Suite des obseruat.* pag. 340 ad finem

Not. (a). An igitur adhuc impossibile Hydrokephalon viuere? an adhuc vnco tractandus? experientiae ferulae animadvertendum facinus committo, iniuriae Cl. HEISTERI quam veritati propius. Sed erubescenda omittam.

(b) Hanc ad not. (x) §. XVIII ex integro retuli.



## §. XXV.

Tertia rupturae vteri causa, est vteri mala conformatio. Vterorum male conformatorum plurima exempla collegit EISENMANNVS (c). Vterum variis locis cartilagineum, et in dura tanquam in cochleas ducta tubera, vidimus Clariss. LEVRETVS et ego, in muliere, cui, septimo grauiditatis mense, morbo demortuae, foetus et dein vterus exsectus. Supernumerarium vteri fundum, a foetu in illo concepto, ruptum habet DIONIS (d). Si itaque ex vteri mala conformatione rumpendus in partu veniat vterus, quod non facile ex propriis signis intelligitur, nec interest, nulla ad partum dispositione semper operatio Caesarea, aperto vero vteri orificio et aquis formati inuersio, malum praecuenire possunt; eadem de vtero in Herniam compulso vera sunt.

## §. XXVI.

Nimia in grauiditate vteri extenuatio, vt et inaequalis a placenta in latere radicata expansio, rupturae vteri causae agnitae sunt. Prima equidem a multis in dubium reuocata fuit, et DEVENTERI et eius commentatoris Galli, disputationibus adhuc hodie omnium aures calent (e).

Natura

(c) In obseruat. rarior. de vtero duplici Argentorat. 1752.

(d) *Dissert. de Generat.*

(e) Non solum in foeminas DEVENTERI et MAVRICAEI de aucto vel minuto, ratione grauiditatis, vteri vo-

lumine nota disputatio est, sed hodie etiam in Algebra, quod BRUIER Doct. Paris debetur famosa. Licet tamen re rite (cuius demonstratio huius loci non est) perpensa, vterque aduersariorum negotium suum satis male egerit. Hic vero mihi

Natura tamen in tempore consulta eam certo certius obtinere hodie veris obseruatoribus, liquido monstrauit, et adhuc saepe in naturali partu per analogiam commonstrat, dum ex sphaera aquarum et capitis in vteri orificium impulsu, vteri orificium, quod ante partum satis crassum fuerat, in chartaceam tenuitatem deducit, et partu absoluto, statim priorem, imo adhuc maiorem illi crassitiem concedit; ex quo euidenter patet, id cum toto vteri corpore fieri posse tempore grauiditatis, quum eadem leges, quae vteri orificium in hora partus distendunt, extenuant, adsint tota grauiditate pro extenuatione vterini corporis, incrementum nempe foetus et quantitas aquarum; verum vti post partum inspecto vteri crassiori orificio inferre non possum, sic fuisse tempore grauiditatis et partus, quum certus sum magis fuisse extenuatum, ita recto prudentis animi sensu inferri non posse reor, vteri grauidi crassitiem, crassitie vteri mox foeti permetiri. Atque tamen in eo **DE-VENTERI** neruus est.

Secunda **STVARTO** (*f*), **BOEHMERO** (*g*) cognita; **LEVRETO** (*h*) contra eundem **DEVENTERVM**, qui pertinacius quam verius idque satis inele-

mihi tantum probare incumbit, vterum quandoque nimium extenuari in grauiditate et hinc rupturae causam existere posse; dabunt id facile omnes **DEVENTERI** sectatores, quod ipse Magister sub finem Cap. VIII se semel valde tenuem inuenisse confirmet.

(*f*) *In Dissert. de Secundinis nociuis aequae ac salutif.*

(*g*) *In Disquisit. 1. de vteri grauidi foetusque, a sede placentae in utero, situ, per regulas Mechanismi deducto.*

(*h*) *Suite des observat. pag. 41 et seqq.*

ineleganter (i) placentam semper in fundo vteri radicari voluit, ita euidenter demonstrata est, vt hodie, inaequaliter, ex radicata in latus placenta vterum distendi dubitari non possit. Quodsi igitur ex harum causarum vna rumpendus vterus praeuideatur, scire oportet, aquarum disrptionem, aut iam effluxis aquis citam infantis inuersionem auxilio esse.

## §. XXVII.

Rupturae vteri causae adhuc sunt, oris vteri angustia, difficilior et insufficiens dilatatio, ab ex-crescentia carnea, vlcere, scirrho, nata occlusio.

Harum causarum aliquot vt etiam paucae praecedentium, mitiorem medicinam admittunt maxime perspecta vnde propullulant radice, sic oris vteri angustia, difficilior et insufficiens dilatatio a fibrarum orificii aut colli vteri rigiditate, resistentia, orta, venae sectio opportune instituta, emollientium admissus vapor, feliciter soluit. Eandem a fibrarum orificii aut colli vteri coalitu, in callum induratione, quorum primum ex dilaceratione in partu, alterum ex inueteratis vlceribus, scirrho (k) fit, incisio tollit (l). Denique

C 2

ab

(i) In obs. Chirurg. de arte obstetr. Lugd. Batav. 1725, cap. IX, pag. 38, vbi contrariae opinionis obstetricantes iumentis comparat his verbis: *Hoc pertinet ad istud hominum genus, quod instar iumentorum pistrinensium caecutiens in eadem semper recurrit vestigia nescium quo loco versetur.*

(k) Qualem casum in Mem. Acad. Reg. Chirurg. Tom. 2, pag. 319 communicauit Celeb. LEVRETVS, quem et ego ipse coram obseruauit.

(l) Hanc operationem quantum nouimus ex arte primus ausus est in Actis Edimburg. Tom. III, obs. XIX, pag. 315. SIMSONVS clarus Professor

ab excreſcentiâ carnea, orta oris vteri, vaginae, anguſtia, reſciſſa mole ampliatur (*m*). Protinus reliquas omnes rupturae vteri cauſas, quales ſunt conuulſionibus actus infans, infans inique ſitus iam indicata §. XXIV, V, VI praefidia tollunt, vnde et in his prophylaxis certa et tuta eſt.

### §. XXVIII.

Deſiderat iam propriam animaduerſionem vteri diſrupti caſus, cuius feliciter curati, vnicum tantum in Medicorum monumentis a D. RVNGIO, Clariff. HEISTERO (*n*) communicatum, continetur exemplum, quod etſi aliqui ex rationibus infra deductis (*o*) in dubium reuocare volunt, nunquam tamen ea quae hic propoſiturus ſum, auxiliorum genera recenti aut inclinato malo medicinam facere poſſe negabunt; etenim etſi in hac calamiti-

Scotus, imitari ſane meretur, quidquid timeat §. 1439 in ſuo opere Chirurgico Clar. PLATNERVS, vtique iam Chirurgiae Gallicae Lumen M. DE LA PEYRONIE ſarcoma vteri oriſicio accretum cum deperditione ſubſtantiæ excindi poſſe reliquit *Mem. de l'Acad. de Chirurg.* Tom. 2 pag. 149.

(*m*) Sic tumorem totam vaginam implentem et partum impediентem extirpauit felici cum ſucceſſu D. SOVMAIN in *Act. Chirurg.* Tom. 2 pag. 318. Pariter concretos vaginae lacertos, Galli *brides* vocant, partui difficultatem et rupturae metum inferentes ſcalpello ſol-

vere iuuat, vt recte monuit D. SIMON, qui in his circumſtantiis operationem Caefaream inique inſtitui demonſtrat, idque adeo euidenter, vt mirum ſit, Clar. PLATNERVM eam adhuc vt vnicum in hoc negotio auxilium propoſere auſum.

(*n*) Vt id teſtatur *Chirurg. part. 2 de partu Caefareo*, pag. 728.

(*o*) Dicunt enim, Clariff. HEISTERVM ſibi contradicere; pag. enim 728, vbi caſum enarrat, videri RVNGIVM verſione, vt LAMOTVS fecit, eduxiſſe infantem, idque patere ex his verbis, quod

calamitate saepe a ruptura vteri ad mortem vix interuallum est, et ipsa etiam ars, ab animi a corpore discessus, celeritate praeuertitur, scitur primo, mortem nulla medicina dilui, et mortalium artem mortalem vitae aeternitatem non promittere posse; scitur secundo, in aliis vteri rupti casibus, satis diu superuixisse mulieres, vt sine auxilio desperatae relinqui non debuerint. Vtique in observationibus LAMOTTI, vna dies plusquam tres, altera quatuor a rupto vtero vixit, HILDANNVS aurificis vxorem totos\* vndecim dies parturientem fuisse affirmat, matronam Bernensem ad minimum quatuor post ruptum vterum dies vixisse intelligimus, licet tamen nullam illi ferret opem aduocata HILDANI vxor, quod septimum diem vt criticum exspectaret mulier sane medica.\* Sic apud alios plus minusue vtero perforatas vixisse legimus. Ex quibus omnibus id tantum volo multis in casibus Chirurgiae locum esse posse.

## §. XXIX.

Ante vero quam eam in partu, quem seu ab initio, seu ad extrema aduocatus dirigit obstetricans, Chirurgiam adhibeat, quum diuersa sit, an postea potius hanc quam illam admissurus sit, ex

C 3

ratione

quod per rupturam vteri intestina mulieris perspicue tetigerit. Id vero aliter fieri non potuit quam prius versione edueto foetu, et manu in vtero relicta, ex his abs dubio rationibus etiam D. SIMON in *Aët. Chirurg.* Tom. 2 pag. 322. statuisse ex HEISTERO,

RVNGIVM infantem ver-  
fasse; totum vero id infringi  
aiunt ex ipso indice, vbi sub  
voce RVNGIVS legitur,  
RVNGIVS Caesaream sectio-  
nem instituit pag. 728. quae  
eadem est, qua versatum fuisse  
infantem creditur.

ratione circumstantiarum, cognoscat. Itaque ut primum vteri rupturam, ex praecedentibus, concomitantibus et consequentibus signis intellexit, proximum est, ut an totus foetus in abdomen allapsus sit, aut an toto fere adhuc corpore vel saltem maxima sui parte in vtero recludatur, probe perspiciat. Scire enim oportet, non in omni casu eandem esse situs rationem, quandoque enim bene ad partum naturalem situm manere (p), quandoque in iniquo illo quem ante habuit, aut parum mutato situ (q) iam ab illo prorsus recessisse, aut in abdomen totum effusum (r), aut adhuc aliqua parte in vtero haerentem (s) inueniri: neque tamen haec cognitio indifferens est, diuersa enim et tutior his quam illis circumstantiis curatio,

(p) Sic in obseruatione 316 LAMOTTI, illa ALBINI, quam in *Dissertatione de partu difficili* habet, in illa D. BVZAN, in eodem quo ante, situ mansit infans.

(q) Sic in obseruatione secunda LAMOTTI, TVDECIS, HEISTERI, SCHOLZII, HILDANI de matrona Bernensi infantes manu per orificium vteri propulsa quieuerunt. In obseruatione STALPARTI Jonae de Pergo mansit infans in iniquo quem ante rupturam habuit, aut parum tantum mutato situ.

(r) In obseruationibus SAVIARDI, HAASII, DOLDII, WIZELII, KNEBLOCKII; totus in abdomen ir-

rupit foetus. Totum tenellum foetum cum notabili funiculi portione in abdomine haesisse habet STALPARTVS. GUILLEMEAU bis vidit inter intestina in sanguine foetum natasse. Absolutissimum foetum in sanguine materno fluctuasse FAVSSIVS, DIONIS, suis obseruationibus confirmant. Colo affixum, ut sine forcipe ab eo auelli non possit, ROONHVYSIVS. SCHENCKII *obs. lib. 4* foetus ad faciliorem partum situs totus in abdomen irrupit. SALMVTHII infans, brachium dextrum pridie extertum retraxit.

(s) Ut in obseruatione HARDERI, de qua merito conqueri potest, quod maxime necessariae circumstantiae omiserit, quas talis

tio: id vel maxime expetit, quae in hac valetudine procraftinanda minime est, ne vires in integrum frangantur, neue ea, quibus operationem ferat mulier, praesidia mora consumantur.

§. XXX.

Totius vero, per vterum in abdomen matris, allapsi foetus signa fere haec sunt:

- (α) Si in vteri orificio haerens, infantis pars, iam os vteri dimisit, nec in illo amplius sentiatur.
- (β) Si orificium vteri, vt plerumque enixio partu accidere solet, magis conuiet; per muliebria sincerus defluit sanguis, aut iam congelatus decidit cruor; denique si vterus collapsus est.

§. XXXI.

Foetus vero in vtero maxima corporis parte aut saltem aliqua adhuc coerciti signa sunt:

- (α) Si in primo casu seu naturalem seu praeternaturalem foetus situm habuerit, vix eum quem ante rupturam habuit, mutauit.
- (β) Si eadem, quae ante orificio offerebatur infantis pars, adhuc ad illud haeret, ita vt quantum corpore sub-

C 4

erit

talis observatio absolute postulat, patet; idem confirmant foetus REISELI, SCHOLZII, vidit et HILDANVS,

in aurificis vxore, totum in abdomine haerentem foetum, laeuo tantum brachio per vulnus in vterum pendulo.

erit abdomen matris infans, probabili tantum coniectura assequi liceat, ni intromissa in vterum integra manu, quis rem curiosius explorare velit.

- (γ) In secundo vero casu pars oblata, seu caput, brachium, manus infantis fuerit, retrocessit et eadem, quae §. XXX, signa adiunt eaque omnia scrupulose exploratio fere edocet.

### §. XXXII.

Alterum illud tamen ignorari non potest, rarius quidem in situm praeternaturalem, frequentius in naturalem compositum, totum in abdomen efferri foetum. Ad haec non semper per vterum, sed et vtero relicto disrupta vagina, ut et dilacerato vteri orificio in abdomen ferri. Atque tunc alia et vix non certissima signa adiunt. Emanat enim fere continuo sanguis, funis umbilicalis aut ipsa etiam placenta procidit, tactu intestina explorantur, et noua et insolita per muliebria in abdomen via hanc rupturae speciem liquido indicant.

### §. XXXIII.

At at ut diuersum in vtero aut abdomine situm foetus, vterum diuersa etiam parte ruptum haec signa commonstrant, ni ea ipsa obseruauerit obstetricans, vix in certitudinem perducere potest, non enim hunc sensum obstetrici habet, ut cuncta extricet, aut ad notam sumat, interrogata vero affirmabit, et ne in negotio, quod non intelligit, peccasse videatur, plerumque adhuc magis mentitur.



titur. Hinc in auxilium aduocatus vix quidquam ex eius relatione concludere potest, ipse vero obstinatione tum matris tum adstantium quandoque reiicitur, aut si etiam examinaturus admittitur, vel ob grauissima matrem prementia symptomata praepeditur, vel ob humilem et depressum trunci in lecto, nec facile sine animi deliquiis, conuulsionibus mutandum situm, vix ad vteri orificium pertingere potest, vnde inexplorati negotii noua incertitudo oritur.

#### §. XXXIV.

In omni tamen casu quantacunque perquisitioni oriatur difficultas, in id vnum incumbendum esse repeto, vt ex signis modo recensitis; an totus foetus in abdomen effusus, an maxima adhuc corporis parte et qua in vtero inclusus haereat, cognoscatur? quis sit foetus in vtero situs? quo loco vterus ruptus, quae rupturae causa? sine hac enim cognitione medicina prudenter nulla fieri potest, licet absolutae explorationi non absit; itaque tenendum est, toto in abdomen effuso foetui, foetui corpore in ventrem illapso, pendulis etiam in vterum artubus, foetui capite, vagina et vteri orificio perruptis, abdomen ingresso, solam sectionem Caesaream, inique vero in vtero sito foetui, foetui vterum pedibus tantum perforanti, vt plurimum versionem, vncum forcipem, mederi; nec ex eo, quod vterus in partu ruptus sit, exsectionem, et quod pars foetus in vtero supersit, versionem indicari, vt satis male id ante *SIMONIVM*, quos ille nimium fideliter

fecutus docuerunt plures (t). Sed ex examine causarum, circumstantiarum, hoc illudue, rectius determinari et ex arte eligi.

## §. XXXV.

(t) HORNIVS et VOELTERVS in casu vteri rupti operationem Caesaream, licet tamen huius fautores non sint, necessariam argumentis evicerunt, MAURICAEVS, PAUCVS, DIONISIVS, DEVENTERVS, quid in hoc casu agendum sit, quasi prudenter tacuerunt. Primus Clariss. HEISTERVS de casu recte meminit, operationem Caesaream in illis circumstantiis, in quibus totus in abdomen ingrederetur foetus, necessario esse instituendam Chirurg. Tom. 2, pag. 726, in illis vero, in quibus totus foetus non, sed solum aliqua pars in ventrem ingreditur, reliqua vero in vtero remanet, imo etiam pars aliqua, praesertim brachium ex vtero propendat, capite vel pedibus per vterum ruptum in ventris cavo haerentibus, sectionem non esse necessariam pag. 727 statuit. Ultimo demum in *Act. Chirurg.* Tom. 2 Clariss. HEISTERI opinionem, ne descripsisse videatur, his verbis pag. 320 reddit SIMONIVS: *Il n'est pas douteux qu'on ne doive faire l'opération Césarienne lorsque l'enfant a passé dans le ventre par la crevasse de la matrice: et pag. 322. Si donc le fœtus*

*présente du côté de la matrice quelque partie propre à le tirer, on doit préférer cette voie à l'opération Césarienne, en supposant même que l'endroit de la matrice qui resserre le fœtus fasse quelque résistance; car par l'ouverture du ventre le danger d'augmenter le déchirement seroit toujours le même.* Quae eadem prorsus sunt, quae Clariss. HEISTERVS dixit, in eo vero ultra progressus est, quod etiam contracto et inuito vtero foetum eximi velit; HORNII, VOELTERI, sententiam, HEISTERVS, SIMONIVS, mecum refellunt, docuit etiam experientia LAMOTTVM, non in omni casu vteri rupti extractionem requiri; vnde illa res extra dubium est. Verum tamen et in ipsis extractionis casibus, non possum HEISTERI, et SIMONII sententiae assentiri, dum volunt versionem suscipi posse, modo in vterq. relicta pars est, qua infans verti possit; si enim is obtingeret casus, in quo praenatio capite abdomen intrasset infans, atque in hoc medio corpore haereret pedibus et natibus vtero reclusis, nemo est qui non intelligat ipsam abdominis sectionem, extractione foetus per vias  
tu ale;

## §. XXXV.

Neque tamen in eo omnis medicina consistit et iam a periculo absoluta aegra est, quum adhuc scrupulosior illi medicatio fieri debeat, vt in salutem restituatur. Haftenus enim tantum, quomodo eae, quae, vulnus vtero fecere, causae, ex illo, aut ex loco, in quem penetrauerunt, eiiciendae sint,

turales longe tutiorem, magisque indicatam ex ipsis artis regulis, tum quod in hoc negotio totus fere foetus per vteri vulnus in abdomen transiit, sub integumentis haereat, quibus dissectis emergit, tum quod ipsa vteri contractione magis in abdomen inuellatur foetus, vnde huic auxilio euidenter facilitas illi difficultas imo impossibilitas, accedit; etenim quo magis contrahitur vterus, eo cauum magis minuit, per quod tota in abdomen effusi corporis moles retrahi debet, vnde non sine ingenti et noua vteri conuulsatione, dilaceratione imo auulsione, extractio si quando possibilis, finiri potest. Quodsi vero etiam patulus, excussus sic in abdomen foetu, vterus foret, quod experienter sperari non potest, an in ipsa extractione non in se reduplicaretur vterus, reduplicatus peluim adimpleret et extractionem redderet impossibilem; neque tamen id totum est, quod ex vagis his praeceptis vtrique mortem adferre potest, si enim moles capitis infantis, quod in his casibus frequenter accidit,

et transfuso in abdomen capite cognosci facile non potest, rupturae vteri causa fuit, quae non haec foret calamitas, si per pedes extraheretur infans; sic in obseruatione SAVIARDI, si in vaginam foetus pedes pendissent, et extractionem per viam naturalem moliri quis voluisset, non solum forti tractione a capite truncum soluisset, sed et ipsam matrem citius, dilaniato et contrito vtero occidisset, ex quibus omnibus euidenter patet, non exinde quod pars foetus in abdomen irrupit, pars in vtero supersit, versionem indicari: sed secundum circumstantiarum rationem videndum quid eligi debeat. Superest iam vt et meum interponam de illa SIMONII sententia, quae vltimo loco posita est, iudicium. Hanc quidem adeo parum obstetriciam deprehendo, vt ne Chirurgica dici mereatur, vnde semper dolui, inuida scientiis factione argumentum de operatione Caesarea LEVRETO ereptum, quid vero in casu simili factu opus sit vide §. 37 Not. (2).

sint, seu nouo ex aduerso, vt in operatione Caesarea, inciso vulnere (u), seu ex ipso si opus fuit, ampliato, et per naturales vias excusso foetu, edocui; vulnus vero ipsum in parte maxima neruorum et vasorum sanguineorum quantitate irrigua, valde illisum (x) hucusque medicatione nondum tentauit,

(u) Galli Chirurgi aptissimo vocabulo *contre-ouverture* vocant, dum causam vulnerantem ex opposito loco per quem intrauit, eximunt.

(x) Recta definitione, recens soluta cohaesio partis mollis vulnus dicitur, solutio vero continui mollis, cum contusione, enchymosi, vulnus illisum. Habet igitur id vulnus compositum quassas et vexatas carnes et rupta in his vasa, eoque plus minusue quo causa contundens maiori minoriue superficie maiori minoriue inpetu applicata parti fuit. Id indies experientia confirmat; verum contundi carnes, rumpi vasa non possunt, quin harum debilitetur aut penitus destruat elater, illorum suspendatur aut suffocetur actio organica, hoc in facile superabili illiso vulnere, illud in desperato obvenit; in primo expurgatum resolutum dein vulnus, cum sanis partibus breui in gratiam redit, in secundo vero neutiquam. Etenim in hoc contritae carnes lacerata vasa iam vitalitatem frustra desiderant suffusa, quem amplius superare non possunt, sanguine verbo

gangraena iam partem exest: alienatur enim color, et etiam post mortem nigrescit contusio, enchymosis. Ex quibus omnibus euidenter patet, quod etiam excussa ex ipso vulnere causa, difficilis curatio quandoque superfit, sed etiam simul solutum est, Clariss. HEISTERO incomprehensibile phaenomenon, quod in *Aët. Acad. Natur. Curios.* vol. 1. obs. CLXXVI, vbi se uterum et praecipue locum illum, vbi disruptus erat, circa oras rupturae nigricantem tenuem et quasi putridum inuenisse dixisset, sic pag. 399 sub finem proponit, *quomodo vero uterus hic adeo corrumpi potuerit et putredine sine sphacelo quasi, idque unico tantum in loco corripere, reliqua uteri parte illaesa, et quidem sic ut mulier semper bene toto gestationis tempore se habuerit, et simul foetus tam magnus et robustus, generari, in utero tali morbidus, sicut saltem apparuerat, potuerit, res est quae, ut lubens fateor, mentem ingenium superat, quamque propterea doctioribus inuestigandam relinquere, quam incertis coniecturis lectores defatigare malo.*

tentaui, qui praecipuus huius argumenti scopus est, quem nemo hactenus pro rei dignitate affectus est.

## §. XXXVI.

Res haec equidem mihi semper adeo clara fuit, vt licet ingenii viribus HEISTERVM superare non intenderim, illud tamen et suos lectores verae phaenomeni explicationis convincere velim. Et reuera non facile intellectu est ex comparatione causae motae et figuratae cum parte laesa, gangraenam in illiso vulnere excitari debuisse; caput enim foetus, quum orbiculatum cauae vteri superficiei applicaretur, illam multis in punctis tangere necesse habuit, vnde etiam diu in illam niti debuit vt disrumperet, quum resistentia semper sit in ratione inuersa punctorum contactuum et potentia motus; atque haec ratio est, quod data eadem potentia motus et vulnerando viscere, instrumenta acuta citius, obtusa tardius, rotunda tardissime solutionem continuu moliantur; verum dum caput sic in vterum niteretur et vterus in caput, vt ex inaximis pariendi conatibus, *quos ab hora matutina quasi decima ad undecimam vespertinam sustinuerat*, liquido apparet, fieri non potuit, quin in parte fibrae magis tenderentur, puncta contactuum minuerentur, distracta vasa dilacerarentur et continuante eadem causa, nasceretur vul-

nus, ruptis et contusis labiis, ecchymosis et in tota ante a capite vexata parte, sugillatio. Quum vero in cadauere caput infantis ad oculos tantum, in abdomen per vterum penetrasse inuenerit, Clariss. HEISTERVS, euidens est caput in disrupta parte toto tempore haesisse; vnde iterum fieri non potuit, quin aut in abdomen per vulnus, illisum nitens caput continuo oras perfricaret, aut sese contrahens vterus labia violentius supra caput contunderet, quibus rebus non concipio qui a gangraena pars feruari potuisset. Annon id indies violentae contusiones docent? atque vt in nostro exemplo nunciam, annon saepe ab inclauato capite, vteri orificii gangraena? ipsius capitis sphaecelus, annon ab harum partium rudiori et frequentiori attrectatione necrosis? Quanto igitur magis in vteri ruptura. Ab inclauatione capitis vteri orificii gangraenam ipse vidi; a rudiori attrectatione funis umbilicalis tantum, sugillationem, ecchymosin in illo nasci, nuperrime obseruaui; vteri posticum latus a capite infantis in partu perruptum, totum nigrum gangraenosum vidi Parisiis in vtero, quem D. DEJEAN, LEVRETO misit 1752. Locum

## §. XXXVI.

Itaque ut primum vterus perruptus est, et ex diuerso infantis in vtero aut abdomine situ, rupturae causa, variandum auxilium intelligitur, scire oportet, in ipsa foetus eiectione, adhuc maximas cautelas adhibendas esse. In harum gratiam curationem in eam, qua abdomine discisso (y), et eam, qua illaeso ventre per vterum foetus eximitur, diuidam.

## §. XXXVII.

In prima quidem, in qua abdominis aperturam experiri statutum est, quum saepe ante vterum, intestina, foetus, offerantur, ne violentur obser-

cum rupturae quassum fugillatum, verbo gangraenosum vidi hic Viennae in casu dein describendo, neque id tamen vquam mirabar, utique et haec gangraena secundum causam est. Ne tamen mea solum Clariss. HEISTERVS stet experientia, quam etiam multis artis magistris familiarem noui, legat observationem: Ephraim HERRMANNI de vteri ruptura in primitiis physico-medici ab iis qui in Polonia et extra eam medicinam faciunt, vol. I, obs. VI, pag. 88 haec verba: *Locus disruptus quinque digitos transversos latus, in circumferentia erat nigricans et ad putredinem pronus.* Quod vero Clariss. HEISTERVM in errorem induxit, erat, quod capere non potuerit, tantam partium alienationem 13

horarum spatio natam: unde eam iam a morbo tempore graviditatis vtero deducere voluit; hinc adeo magnum et robustum in hoc generatum foetum, mulierem tota graviditatis tempore de nullo morbo vel singulari symptomate conquestam miratur, et merito si iam haec graviditatem labes tenuisset.

(y) Quo loco abdomen secari debeat, diuerse multi sentiunt, quidam lineam albam incidunt, quod pessimum, alii musculos rectos, nec arteriae epigastricae parant, quod non semper tutum; optime Clariss. HEISTERVS Chirurg. Tom. 2 pag. 718. LEVRETUS Suite. Art. IX, ubi etiam rationes de eligendo abdominis latere nobis communicat.

obseruandum. Tum si in ventrem fusus foetus est statim eximendus; si vero in ipsa vteri ruptura adhuc haeret nec hunc vulnus dimittit, quod etiam accidere potest, non vi, nec moleste sedula tractione, qua lacerae iam carnes adhuc magis atteruntur et colliduntur, sed scalpello, ampliato ea maxime parte vulnere, qua maior ecchymosis, sugillatio (z) eiiciendus. Sed et haec Chirurgia alias quasdam animaduersiones desiderat; si enim noua sectione vulnus ampliari debet, cauendum a ligamentis rotundis (a) est, quorum sanguinea vasa et ampla et distenta, si ab vtero soluerentur, non solum sanguinem copiosum funderent, sed et vterum suo pondere grauem profundius in pelvim demitterent, vnde infinita mala sequi possent. Non minus ab vteri fundo, quod et huic vasa maiora, et a placenta huic vt plurimum adhaerente, diametro aucta, cauendum est. Neque etiam nisi summo cum periculo laeduntur in anteriori parte vesica, in posteriori rectum (b), et in omni non

(z) Hoc duplici bono fit, tum vt sana pars nouo vulnere non laedatur, tum vt contusa facilius extenuetur et quiescens et stagnans ex ea sanguis euocetur; ex his paene rationibus est, quod hanc Chirurgiam, illa quam *Acad. Reg. Chirurg.* Tom. 2 pag. 322 proponit, magis rationalem habeam, minusque periculosam et barbaram circumstantiarum consimilium parilitate. Hinc etiam facile intelligitur, quid his rebus, vbi ex angustiiori vteri

vulnere in operatione Caesarea, extus dari foetus non potest, conducibilis haberi debeat, num modesta vulneris, tractione, dilaceratio, num scalpello ampliatum vulnus.

(a) Quae ex summa, eaque anteriori facie vteri emergunt et abdomine lateraliter aperto, facile vulnerari possunt.

(b) Vnde etiam haec receptacula ante operationem Caesaream semper deplenda esse consulere maximi in arte viri.

non satis coercita intestina, quod iam contracto vtero facilius fieri potest, maxime si minus perite scalpellum ducatur.

### §. XXXVIII.

In vtroque vero casu, seu in abdomine seu medius adhuc in vtero quieuerit foetus, vbi cum secundinis extus datus est, ne qui in ventrem sanguis aut alius humor confluit, ibi maneat sedulo prospiciendum. Hunc vt notum spongia vulnerario decocto aut vino rubro tepida ex facili bibit. Atque in hac re omnes satis conueniunt. De cura vero vulnere ante Gastroraphiam danda non ita; in vteri enim simplici vulnere, vti in operatione Caesarea deliberate instituta, extracto cum secundinis foetu et fordibus expurgatis hodierni Galliae Chirurghi vteri vulnus naturae committunt, abdomen vero breui ex arte consuunt, quod Clariss. **HEISTERVS** miratur (c), qui nimiae haemorrhagiae linamentis spiritu vini rectificatissimo ebriis, vulnere vero curationi balsamo Copaiue, alioque simili, obuenerit (d). **ROVSETVS** iam decocto vulnerario ablui vulnus (e); abluto simili decocto vulnere balsamum calidum, quod aequales balsami Arcaei et olei Hyperici portiones recipit, infundi vult

(c) Tom. 2 Chirurg. pag. 719 ad (not. c): *Moderni Galliae Chirurghi licet praestantissimam hanc operationem saepius ac feliciter ab ipsis perfectam referant in Mem. Acad. Chirurg. pag. 640 et seqq. tamen haemorrhagiam quibus artificibus hic compelescuerint, quasi rem*

*nullius momenti sicco pede praetereunt; at forte non tantam experti sunt, magnam esse integro capite negat ROVSETVS. An non et ipsa vteri contractio haemorrhagiam praeuertit?*

(d) Ibidem in textu.

(e) Pag. 222.



vult R V L E A V (f). Et hae sunt diuersae in simplici vteri vulnere curationum methodi; de composito nihil statutum est.

### §. XXXIX.

Postulat autem cum sugillatione et ecchymosi illisum vulnus, quale ruptum vterum semper tenet, aliam longe medicationem, eamque secundum contusionis intensitatem et tempus et inde emergentia symptomata variatam; si enim statim ubi vterus rumpitur, abdomen aperitur, et contusio adhuc cruda, nondum coacta est, resolutio sperari potest, vexatis, solutione salis ammoniaci vel marini in aqua cum spiritu vini remixta, calide ablutis fotis. Alienum in hoc negotio scalpellum est, et ad haemorrhagiam praepostera adstringentia. Si vero iam aetatem vulnus habet, et contusio coit, scalpelli operam, profunda ecchymosis fere desiderat, ut quiescens euocetur sanguis. Hic tamen non nisi magna cum prudentia concidi debet, quia plerumque id vulnus cum stupore est, quo in casu alta, mortifera incisio est, ut omnibus egregiis practicis notum; superficialia vero, quae ob partis strangulationem quandoque fieri debet, effusio sanguine, ut et ipsum primitium vulnus, spiritu succini, in quem aliquid olei terebinthinae datum est, aut etiam alio medicamento actuoso penetranti, quae primaria in hac valetudine intentio est, foueri debent.

## §. XL.

Quodsi vero iam gangraena vulnus habet, quod in violenter collisa et stupefacta carne breui obvenit, etiam vtero parcendum non est, nam vt omnibus notum, vtut, ad vitam necessaria pars corporis est, eo quo computruit momento ad illam amplius non facit, quin contra hanc ipsam nisi tollatur, destruit; itaque in exsectione putridi, gangraenosi opera locari debet, est tamen prudentiae consilium, non exacte et curiose ad viuum omne tollere, quia discisso vitali vase lethalis haemorrhagia fieri posset; dum quod remanet corrupti spiritibus acidis vel solis, vel spiritu vini dulcificatis, prout plus minusue relictum est, facile aduri potest. Scire autem adhuc oportet, hanc Chirurgiam maxima cautela esse instituendam, quod vulnus in cauum vteri penetret: adustis digressione superhaberi debent.

## §. XLI.

In secunda vero curatione, vbi abdomen aperire, necesse non fuit, sed versione aut instrumentis foetus extrahendus venit, de vulneris illius natura nihil, nisi per coniecturam sciri potest; hinc et medicinam difficiliter recipit; atque in hac re exsectio, naturali extractioni praeualet. Id tamen in ipsa extractione per naturales vias cavendum est, ne vterus magis dilaceretur contundaturue; exempto vero cum secundinis foetu, vterus a sanguine purgari debet, hunc facile immissa manus euerrit, in ventrem autem effusum minus

minus euocare valet, vnde in id dein operam dare debet obstetricans, vt in latus quo vterus perruptus est, aegra inclinetur, quo is facilius exitum (g) dein inueniat. Quodsi vero hoc tempore, intestina, omentum per vteri rupturam prolabantur, quod etiam accidit, refundi debent nec ex vtero manus danda est, quam illa non amplius euoluantur; ad quod et in alium situm vterus, si e re absolute est, subleuatus, aut spontanea vteri contractio non parum contribuunt. Abdomini fomenta penetrantia et resoluentia saepe imponi debent.

## §. XLII.

Seu vero in abdomen, effusus sanguis, si sit, hianti vulnere non occurrat, seu constrictum vulnus, quo minus extus feratur, impediat; scire oportet sine discrimine in ventre relinqui non posse (b): in primo casu lotionem in vterum, quae et in abdomen efferatur, sine periculo coniici (i): in vtroque nouo abdomini inciso vul-

D 2

nere

(g) Nunquam satis laudauero immortales obseruationes PETITI, filii, et GARENGEOTTI in *Mem. Acad. Chirurg.* quibus conuincunt favente anatome, liquidum quodcumque seu per rupturam, seu per vulnus extrauasatum in abdomine, ad anteriorem inferioremque ventris partem agi, cogi, inter intestina nihil recipi, Mechanismo illis primum et feliciter explicato, vide *Essais sur les epanchemens. Mem.*

*de l'Acad. Tom. 1, pag. 237. Suite. Tom. 2, pag. 92. Sur le même sujet par Mr. GARENGEOT pag. 115.*

(b) Vt in eisdem Actis confirmant euidenter obseruationes modo laudatorum virorum,

(i) Tum vt concretus in illo sanguis diluatur, et dein facilius per vteri rupturam efferatur, tum quia in abdomen data lotio resorberi potest, vt docuere experimenta anatomica,

nere effusa feliciter euocari (*k*): atque hoc vnicum in arte auxilium est, si mulierem seruire intentio; quae vero abdominis incidenda sedes? Quibus signis sanguinis in abdomen cognoscatur extrauasatio, ita exacte in modo laudatis Actis ab his immortalibus viris descriptum est, vt addi nihil possit.

## §. XLIII.

Alterum vero illud in vtraque curatione ignorari non oportet, vulnera vteri grauiditate aucti, fere ad haemorrhagiam et inflammationem spectare, ex hac facilem esse transitum in resolutionem virium, ex resolutione virium in animi deliquia, sudores frigidos, conuulsiones, mortem. Ex illa foedam oriri suppurationem, ex suppuratione male habita vlcus, ex vlcere fistulam, aut quod longe frequentius in sugillatis quasi et collis contusis vteri carnibus obuenerit, gangraenam, aut scirrhum aut cancerum: sed quia de his iam apud Medicos et Chirurgos relatum est, nihil adiiciam.

ca, tum quia, licet non refoberetur, facile effluere posset cum sanguine, in cuius gratiam nouum vulnus fieri debet.

(*k*) Vt id euidenter conuincit observatio D. VACHER *Hist. de l'Acad. de Chirurg.* Tom. 2, pag. LXXXVIII.





# HISTORIA

## VTERI IN PARTV DISRVPTI, ET INVENTI IN ABDOMINE FOETVS.

---

**V**igesima Augusti 1755 vocor Viennae in suburbium Diui LEOPOLDI, in plateam venatoriã dictam, ad mulierem, iam extrema agentem, vt ipsa referebat nuncia; ad interrogata vero sic respondit, triginta septem circiter annorum mulierem iam secundo vtero gerere, primum partum infantis praecrassi, foetentis, diebus tribus cum totidem noctibus durantem, fuisse vel maxime crudelẽ, hunc quidem hanc aetatem, quum octaua et decima Augusti, circa nonam vespertinam primis tantum incideret doloribus, nondum consecutum, nec vnquam consecuturum sperari posse. Mulierem enim aliter, quam in priori confectam, agere, angi, agitari, singultire; aquas vix primis doloribus abortis, ruptas dolores fuisse tergiuersantes, iam fortes, iam debiles et fractos; obstetricem, quid in vteri orificio offeratur, hucusque non exposuisse, abdomen quidem sed sine fructu pressisse, praescripsisse medicum; mulierem vero iam frigidis artubus, ventre inflato exanimari.

Adueniens cum D. LEBMACHER M. D. mulierem ab vltima vita circa abdomen adhuc calentem inuenimus; a dimidia enim tantum hora desiderabatur. Itaque instituta operatione Caesarea totum in abdomen allapsum foetum, ita situmprehendimus, vt vertice in os pubis, facie in dextram matris spectaret, aure sinistra et humero sinistro, tanquam puluinari, vtero incumbentibus; inde dorsum infantis sinistrae matris parti imminebat, premebant lumborum vertebrae matris infantis nates; femora et pedes infantis ad suum abdomen reducta et reduplicata in cauitate ossis ilei dextri iacebant, iuxta haec et abdomen, brachia manus, et funis vmbilicalis residua portio.

Educto foetu succubus conspiciebatur vterus, vt enixo foetu esse solet, solidus, crassus, ruber, in anteriori vero, quae vesicam vrinariam et pubem spectat, facie, perfecte in articulo cum peritoneao perforatus, et ad pugni tantum magnitudinem hians, ita vt, si contractilis vteri potentia, nota non esset, qui tanta capitis et corporis moles per adeo exiguum foramen traici potuerit, concipere non posses. Erat quidem anterioris labii caro satis conspicua et crassa per totam longitudinem vsque in os disrupta, et a succingente ibi loci peritoneao diuulsa, sed inde rupturae longitudo, non viae laxitas patebat; etenim peritoneaum eadem tota longitudine integrum erat, imo solito crassius lineam cum dimidia facile superabat. Caeterum erat in ipso ostio rupturae  
caro

caro quassa, ex contusione foeda, nigra, partus in ventrem siccus, crudelis magis quam cruentus, non enim tali copia effluxerat ex ruptis vasis sanguis, vt intestina imbueret, aut inter haec aut in alio loco, in grunum coiret.

Infantem quod concernit, erat hic praecraesus, ingenti capitis vastitate, ponderauit libras civiles 23; ossae cranii thecae integumenta, circum circa in hemisphaerium nigra, gangraenosa, ossa cranii compressa, fracta quasi; auris dextrae membrana tympani, extus in sphaeram pulsa, et conspicua; secedebat ad attactum cutis a toto corpore, scroto, vt plerumque esse solet, gangraena conspurcato.

Instituto dein examine et per plures dies a D. LEBMACHER, quem de hac re rogaueram, continuato, sciuius grauiditatem, cum pertinaci et dolorosa, in dextro hypochondrio, grauitate increuisse; partus dolores hora nona, decima et octaua Augusti obortos, per totam noctem vt et plurimam diei subsequens partem, variata intensitate, nam et duo tresue fortiores a tribus quatuorue debilibus excipiebantur, continuasse; aquas primis statim doloribus effusas per totam adhuc noctem stillasse, profusiores tamen, circa quartam matutinam lectum inundasse. Atque id ab omnibus confirmatum est. Obstetrix vero, quam ignorantiae pudore mentiri non pigeat in primo examine D. LEBMACHER, seorsim confessa est, se prolapsum statim ab initio funem vmbilicalem, oblique situm infantis caput distinxisse, prima

etiam iam nocte materiem foetidissimam ex genitalibus defluxisse, nec toto tempore cessasse, matrem infantis motum nunquam sensisse. Altera die quae iam nona et decima Augusti erat, hora secunda in fellam ut vocant parturientium depositam mulierem vehementes dolores habuisse; in his, ut iuarent enitentem, ab hypochondrio dextro ut et a ventriculo, fortiter deorsum abdomen premi iussisse obstetricem, idque toties repetitum, quoties dolor ingrueret, et continuatum tamdiu donec cessaret; his encheiresibus partus promoueri negotium dixisse obstetricem; inter premendum vero, atque haec propria obstetricis confessio est, intolerabilem cumque vrentem in parte anteriori, pubis nempe, ubi et ingens tumor, durus, tactu aduertebatur, semel sensisse nitentem, tum ubi prius durus tumor erat, vacuum natum esse, et dolores omnes cessasse. Dein in lecto collocatam in utrumque latus, quod ante ob vehementiam cruciatus non licuit, cubare potuisse; sed iacuisse insensilem. Vena pedis ob metum gangraenae, secta multum materiae atrovirescentis vomuisse; hora quinta iterum in fellam parturientium depositam nullos partus dolores habuisse, sed ex genitalibus cruentas membranas exisse sine puro sanguine, in dextro latere iterum implacabilem sensisse ardorem, successisse ad vesperam singultum, qui fere continuo ad finem illius diei civilis duraret; remisisse hora duodecima noctis, hora quarta matutina vigesima Augusti rediisse, continuasse; hora nona post datum et redditum enema, prorupisse ex genitalibus,  
pendu-



pendulam ex funiculo vmbilicali placentam, non ligato funiculo forfice abscidisse obstetricem, tandem tanta calamitate miserandam mulierem singultu, conuulsionibus confectam expirasse.

Reliquum iam est, vt quaedam in hunc casum commentaria, quasdam, in malas encheireses, animaduersiones ponamus, vt nostris partibus in integrum satisfaciamus, atque primo loco habetur,

1. *Grauiditatem cum pertinaci et dolorosa in dextro hypochondrio grauitate increuisse.*

Dum anteceptas DEVENTERI opiniones exuentes egregii viri, liquida mente naturam peterent, frequenterque non solum in omni vterini corporis puncto placentam radicari, sed ex hac hic vel ibi loci radicata diuersa emergere phaenomena et partus variari successum perspicerent, obliquitatem seu vteri, seu foetus, ab illa vel maxime causa dependere satis fundate statuere: verum quia tum vteri tum foetus obliquitas semper maiorem minoremue partui adferebat difficultatem, obseruauerunt; an non iam in grauiditate, ea cognosci posset, atque tum constitit frequenti obseruatione grauiditatem, quae placentam vteri laterallyter adhaerentem habet, molesto in parte pondere angere. Inter primos in dissertatione STUARTI se ita explicat egregius vir FRIEDRICH: *grauida in illo latere, quo placenta haeret, abdomen plus eleuatum extensumque, repletum et ponderosum habet, prae altero, quod magis depressum, vacuum atque molle.* Praeternaturalem hanc placentae ad

latus adhaesionem, ex abdominis inaequalitate, duritie, altitudine, dolorosa grauitate in illo latere, in quo maxime foetus mouetur, cognosci dicit Clar. BOEHMERVS. Alia eaque grauissima his adiecit signa Max. LEVRETVS, quae et cum illo saepius, saepius seorsim obseruauit. Sed quænam ratio est, cur non aequatis sinistro lateri uteri, ut dextro vicibus, adhaerere placentam, obseruetur? Quoniam igitur et nostrae mulieri crescente grauiditate pondus, dolorosa grauitas vni sedi infixæ, in latere nempe dextro incretaret, difficile appropinquante partu negotium metui ex arte poterat, ut id sequentia liquido confirmant: etenim

*2. Partus dolores per totam noctem ut et plurimam diei subsequenti partem variata intensitate (nam et duo, tresue, fortiores a tribus quatuorue debilibus excipiebantur) continuabant.*

*Partus* primum grauiditatis stadium a momento conceptionis incipiens ad finem tertii expirat mensis: medium a quarto ortum mense ad septimum finitur; et vltimum a septimo ad nonum plerumque, aliquando vltra extenditur. Quæ ad finem primi stadii et toto medio fiunt viuentium corporum ex utero motiones, abortus, quæ ad initium et medium terminum vltimi, praematos vocamus partus, sic ad initium primi stadii dicimus effluxionem aut consistentis iam aliqua ætate germinis, eiectionem ut ad finem vltimi grauiditatis stadii legitimum et maturum partum.

*Dolores*, vt recte intelligatur, quid partus dolor obstetricantibus proprie habeatur, praeter demonstrationes anatomicas de musculari vteri potentia, adhuc praesciendum est, ita constructum vterum esse, vt vteri fundus vastaque ad eum regio, tum vteri orificium et quod super hoc ponitur collum contraria in se virtute antagonistarum perfecte more nitantur; est quidem hoc *LEVRETO* omnium primo cognitum et demonstratum, hodie vero a cunctis aliis assumtum et obseruatum.

Iam vero a primo partus ortu, qui a qua demum causa determinetur, in vanum hucusque se torserunt philosophi, vteri fundus vt et vasti ad eum parietes mutuis copiis, ad se nituntur sese contrahentes *ex obs. obstetr.* At sese contrahens musculus tumet, crassescit, durefcit, accurtatus mole sua augetur *ex obs. anatom.* Igitur in id quod vterus ambit, cauum nititur. Iterum fundus et latera vteri contrahi et in cauum niti non possunt, (summam resistantiarum longe superante potentia) quin suam ante late septam capacitatem minuant *ex obs. phys. et anat.* Sed caui sphaeroidi aqua et foetu repleti, quale cauum vteri est, in vno loco minui non potest, quin in alium minus resistantem aqua impellatur *ex iisdem.* Quum vero hemisphaerio superiori vteri e directo opponatur orificium vteri, quod minorem resistantiam habet, quia apertura disiunctum est *ex anat.*, ex aquarum, capacitae fundi et laterum minuta, expulsarum et in partem minus resistantem impulsarum impetu, vteri orificium sensim vinci, distrahi

distrahi necesse est, atque haec verorum partus dolorum ratio est. Igitur id, quod vulgus partus dolorem appellat, proprie nihil est, quam fundi et laterum vteri contenti expulsionem et orificii vteri violentam dilatationem, molientes, contractiones. Atque ex hac sola et clara verorum dolorum idea, quae certissima partus signa haberi debeant, quae non possint, liquido intelligitur, nec minus comperta et perspicua euadunt plurima phaenomena, quae alias satis nodosa inexplicata mansissent, ut sunt, quare vteri orificium primis doloribus renitatur, renitens arctetur magis quam dilatetur, semel victum vero semper magis amplietur et dehiscat; quare violenter sese contrahente vteri orificio vterus infletur magis ad superiora, et repulsionis vis in fundum magis impendatur. Quae vero ratio sit alternae vteri contractionis, ut et alternae quietis, neque ex his, neque ex aliis adhuc eruere potuerunt philosophi, quidquid somniet D. BUFFON derepente et quasi ex somno humani corporis philosophus (\*).

Quotuplices vero partus dolores sint, omnibus obstetricantibus relatum est. Nostrae mulieri dolores erant tergiuerſantes, iam fortes, iam debiles, quos omnibus illis casibus, quibus radicata vteri lateri placenta est, adfuturos iam ex obseruatis praedixerat LEVRETUS, atque is etiam effectus ex sua causa liquidius intelligitur, quod in dato casu aut foetus, aut vterus, aut vterque simul obliquatur, quibus rebus orificio vteri directe haud insistent

(\*) Hist. naturelle du cabinet du Roy,

insistens infantis caput, partus dolores nec constantes, nec vtilis mouere potest.

3. *Aquas primis statim doloribus effusas per totam adhuc noctem stillasse etc.*

Hoc iterum phaenomenon placentæ lateraliter radicatae signum est; commonstrat enim euidenter ex ablato ex adhaesione placentae vteri aequilibrio in obliquum compulsum infantem fuisse.

Ex spumantis libidinis gutta diuino emergens artificio homo aquis innatat, membranis, coercitis, quarum quantitas in ratione inuersa aetatis foetus constanter maior, ad legitimum tamen partum saepe in multis variat. Sunt hae proprie aquae foetus, (nam de spuriiis hic nihil statuum) quae ante partum plerumque, in partu et post partum aliquando, effunduntur. Ex modo vero ut et quantitate his temporibus effusarum aquarum, partus criteria non adeo inepta desumuntur, ut id naturam obseruanti patet. Etenim in partu naturali placenta vteri fundo radicata, orificium fundo directe subiacet ad axin peluis, tum foetus vtero inclusus haeret in axi vteri et caput praeuium imminet axi peluis, his rebus doloribus continuis caput infantis depellitur, sensim magis orificio vteri impellitur. Stat id obseruato. Sed caput infantis sphaeroideum est et corpus sphaeroideum ex cauo sphaeroideo flexili emergens hoc in omni puncto tangit, vnde ante caput pulsas aquas in sphaeram, vteri orificium in circulum cogi necesse est, et illa adeo nota obstertricibus felicitis futuri partus spes illucere. Tum ruptis

ruptis membranis, si caput vndique ostium vteri obturat, ea tantum aquae effunditur copia, quae ante caput et ostium intercepta fuit, quodsi adhuc maior post foetum in vtero est, tardioris negotii, licet leui encheiresi tollendum obstaculum intelligis, quodsi vero caput vteri ostium non obturat, non solum ea, quae ante caput haesit, copia effluit, sed etiam post foetum residua, quod vtrunque naturalem semper partum efficit.

At vero in casu dato obliquitatis vteri, vbi placenta vteri non ex fundo sed ex latere pendet, vt et aliis similibus iniqui infantis situs, orificium vteri ab axi peluis deuium est, igitur etiamsi bonis rebus foetus haereret in axi vteri vt in partu naturali, quum axis vteri non incidat in axim peluis, per quam emerfurus infans est, in marginem osseum aperturae superioris peluis dirigi impingique infantis caput, tum magis illud orificii vteri latus, ad quod motum, premere necesse est, quibus causis tum fit, vt membranis ruptis aquae vno impetu vel omnes effundantur, quum nihil obturet, vel etiam continuo depluvio stillent, quod vtrumque mali negotii semper indicium est, vt id in nostra muliere confirmatum videmus, etenim illi primis initiis aquae ex leui causa fluxerant totoque tempore stillabant, infans simul oblique situabatur prolabente fune vmbilicali: an vero etiam materies foetidissima prima statim nocte ex genitalibus mulieri defluerit, nec toto tempore cessarit? an mater simul infantis motum non senserit, a veritate magis,

magis, quam calamitatis acerbitate, quam vt se purgaret obstetrix, omnibus inculcare nitebatur, abesse credo; ego equidem sic aestumo. Nec mortuo foetu vterum vnquam rumpi aut vidi aut legi.

4. *Altera die in sellam parturientium depositam mulierem vehementes dolores habuisse: in his vt iuuarent enitentem, ab hypochondrio dextro vt et a ventriculo fortiter deorsum abdomen premi iussisse obstetricem, idque toties repetitum, quoties dolor ingrueret, et continuatum tamdiu donec cessaret: . . . inter premendum vero intolerabilem eumque vrentem in parte anteriori, pubis nempe, vbi et ingens tumor durus tactu percipiebatur, semel sensisse nitentem, tum vbi prius durus tumor erat, vacuum natum esse, et dolores omnes cessasse, iacuisse insensilem.*

Quid sella obstetricia sit; figuris et verbis apud multos relatum est. Quibus in casibus sella lecto, aut lectus sellae anteponi debeat, ab iisdem etiam scriptum. Hic tantum de illo acturus sum, quo nitenti obstetrix subuenit, auxilio. Hoc equidem non spernendum illarum enchei-resium specimen videtur, quae in ipso artis limine, dum ars inter solas mulieres staret, adhibitae sunt et adhuc in dies per traducem vt arcae a vetulis iunioribus communicantur. Vidi saepius, atque hoc hic loci familiare est, in nitentis ventrem capite irrupisse obstetrices totam abdominis formam destructuras, alias duabus manibus abdomen vehementissime pressisse, nec illud nouum

nouum est orbe ligneo aut stanneo tum pro eiectione foetus, tum pro expressione placentae totum ventrem ab illis premi, quati.

Verum quantumcunque etiam hodie in has encheireses artis Magistri animaduertant et stirpitus exigere errorem nitantur, quod et optimi Medici et Anatomici obstetrices in errore confirmant, nihil consequuntur; et sane, an non mirandum et dolendum simul est recentioribus temporibus, iam adulta arte in *Act. Nat. Curios. vol. IX, obs. LXXVII*, pag. 323. Clariss. gloriari DE GORTERVUM, se abdomen parturientibus felici cum successu saepius pressisse, id edocuisset omnes obstetrices his in circumstantiis: *Quando foetus extensis pedibus exitum molitur, si vteri os nimis contractum manet, ingens tumor abdominis cum multo dolore non raro observatur, qui parturientibus magnum dolorem infert sine parturiendi spe. Frustra enim conatur foetus viuens extensis pedibus moliri exclusionem, quoniam abdomen cedens omnem adimet vim pressionis ad vteri os, dum demto sustentaculo ad pedes foetus, omnis ille conatus ad vteri os illuditur: si vero illa abdominis pars, quam detrudit foetus exitum moliens, fuisset suffulta et cedere non potuisset, omnis actio foetus in vteri os applicata, superasset eius orificii contractionem et excluderetur foetus.*

Primum quidem quod in hanc opinionem ex arte statuendum censeo, illud est, quod hae circumstantiae, ubi extensis pedibus exitum molitur infans, rarius adsint, etsi adsunt, nec ab illo, nec

ab



ab his, quas docuit, obstetricibus facile cognoscantur, tum quod contractum nimis vteri os vt et ingens, cum multo dolore sine maiori partus spe, abdominis tumor, (quae duo characteristica huius casus signa obtrudit) has non certo exprimant describantque. Quodsi id ita est, an ignotae per signa foetus extensioni pressio rationalis?

Secundum est vteri sese contrahentis mechanismum viro non fuisse perspectum, supponit enim foetu extensis pedibus exitum moliente abdomen cedere, et inde omnem vim pressionis ad vteri os demi, contra suffulta et depressa parte omnem impetum in vteri os impendi, quod nec arti, nec veritati congruit: Sic vero pergit: *Hoc felici cum effectu monitu meo in parturientibus obseruau applicata manu supra intumescentem abdominis partem, qua impediiebatur illa extensio in parturiendi conatu: sentiebant enim parturientes statim solamen doloris, et foetus facile excludebatur, in quo casu verebar vteri ruptionem a vehementi foetus robustioris extensione.* Irrationalem hunc processum, quem felix forte fortuna excepit effectus neminem in arte esse credo, qui non miretur, experientiam quidem sonat, sed an non multo agrestioribus, vt dein notabo, et sua fortuna fuit; etenim sic aestumo, si aliquo in casu vterum ad rupturam perducere aliquis intendisset, nulla alia arte, quam hac, id facilius fuisse consecutum, dum partem percutiendam et rupturam quasi effugientem propius in sphaeram actiuitatis corporis percutientis adigeret, quia certis constat obseruatis ex infantis conuulsione vterum plerumque rumpi.

E

Praeter-

Praeterea an pressio membra foetus moderabitur? an motus sufflaminabit? certe non, unde caeco et inuita natura impetu fugiens percussione vterus ad infantem his rebus repellitur, quia sic facilius rumpitur. Aliud est aliis rerum circumstantiis, et ubi rumpendi vteri nullus metus; neque tunc tamen impedita in parturiendi conatu vteri extensio semper tuta, tum quia et vterus distentis vasis turgidus, spongiosus, facile contundi, vexari potest, tum quia sic facile ex vteri axi foetus, vterus ex axi peluis detruditur, quo in casu impertinens partus negotium priore longe peius emergere posse, illi facile intelligunt, qui et in vteri grauidi positum animum flectunt, et in partu cum natura loquuntur. Vtique obstetricantibus notum est ex situ matri dato, quia et hic foetus, vteri peluis axes mutare valet, partum tum accelerari tum retardari posse; et bonae DE GORTERI obstetrices cruda nec dimensa pressiois directione, quod ipsa natura nequit, foetum adeo feliciter depellunt, exprimunt. Verum quidem est Clariss. DE GORTERVUM pressiois summam non expendere et sustentaculi aut manus extensionem abdominis impediens nomine uti, et hinc aliquem coniecere posse non consulere validam pressioem: at is sibi fucum facit; si enim effectum illud sustentaculum aut quocunque demum nomine illud vocare lubet, non consequitur, praceptum non exegit, ergo debent manus aut aliae machinae ita applicari, ut natam ex parturiendi conatu abdominis extensionem impedian, ut ipsemet contendit, quod non leui sustentaculo, sed

sed verâ et magna appensione obtineri posse, omnes facile capiunt, qui in partus dolore totum abdomen et vterum instar lapidis rigere, et ad hanc extensionem impediendam potentiam considerarint; quantum tamen in hoc consilio cautior fuerit Clariss. DE GORTERVS, eo euidentius imprudentior fuit TH. BARTHOLINVS in obseruatione *De foetus mortui expulsionem violenta*, in qua et BARTHOLINVS BARTHOLINVM et Philosophus Philosophum et Medicus Medicum exuit, vt supra quod credi possit agrestem et irrationalem rudissimi ingenii processum extolleret laudaretue. His verbis vero raram hanc encheiresin *Hist. Anat. et Med. rar. hist. 83, cent. 6* adumbrat.

#### FOETVS MORTVI EXPVLSIO VIOLENTA.

*Varia in foetu mortuo expellendo moliuntur Medici et Chirurghi tam veteres, quam nouitii et internis et externis: instrumentorum operam aduocant PAVLVS, CELSVS, ALBVCASIS, AQUAPENDENS, SCVLTTETVS; sed si auersas puerperarum voluntates inuenerint, frustra erunt. Vbi igitur interna nihil proficiunt et instrumenta refugiunt puerperae caeteraque conclamata, vt mater conseruetur, vna compressio vebemens abdominis per adstantes auxilio erit; noui in Gallia puerperas, quae feliciter etiam viuos foetus enituntur compressione externa manuum propriarum, qua blande ad exitum propellunt embryonem, et ita sine aliarum mulierum auxilio breui ipsae negotium susceptum conficiunt. Foetu vero mortuo praesertim in partu ipso haerente, quum propter*

angustiam viarum, matrisque imbecillitatem ex angustis eluctari non possit. Ne sine spe misera puerpera relinquatur, impositus orbis ligneus vel stanneus super umbilicum fortissime manu Medici vel adstantium, percutiatur. Ut remedii nouitas sit conspectior, exemplo illustrabimus, cuius nobis testis est oculatus vir intimiori amicitia et naturae scientia probatus D. AHASWERSVS PAYNGK.

Alexandriae in Insubria Dantiscana uxor Centurionis robusta nullo interno remedio propellere valuit foetum in angustis materni sinus haerentem et mortuum. Vnde praesente animarum Curatore, Medicus Hispanus adferri sibi curauit orbiculum, qui mensae insterni solet, eumque umbilico parturientis impositum magno nisu manus percussit, ut et dolores clamore prodiderit puerpera, et dictum factum excluderetur foetus salua matre et superstita, sed larga haemorrhagia ob uteri conatus et dolores insequente. Nullam hic rationem auxilii inueniemus, nisi ex compressione abdominis forti, qua vi contenta excernuntur.

F I N I S.



V411539075